

**Тестовые задания по клинической фармации  
из буклетов 2012-2016 гг.  
(верный вариант ответа – А – во всех заданиях)**

Какое из нижеприведенных лекарственных средств применяется при инфаркте миокарда для проведения тромболитической терапии? (2012, № 4; 2014, № 9; 2015, № 9; 2016, № 10; ИБ)

- A. Стрептокиназа
- B. Гепарин
- C. Фенилин
- D. Тиклопидин
- E. Ацетилсалициловая кислота

Какой препарат является специфическим антидотом при отравлении препаратами железа? (2012, № 19; 2013, № 21; 2014, № 24; ИБ)

- A. Дефероксамин
- B. Протамина сульфат
- C. Бемегрид
- D. Атропина сульфат
- E. Пеницилламин

Беременная заболела пневмонией с тяжёлым течением. Какой из названных антибактериальных препаратов целесообразно ей назначить? (2012, № 23; ИБ)

- A. Цефотаксим
- B. Гентамицина сульфат
- C. Тетрациклина гидрохлорид
- D. Офлоксацин
- E. Бисептол

6-летний ребёнок заболел пневмонией. После лечения ребёнок потерял слух. Какая группа антибиотиков могла вызвать это осложнение? (2012, № 37; 2014, № 45; ИБ)

- A. Аминогликозиды
- B. Цефалоспорины
- C. Макролиды
- D. Пенициллины природные
- E. Пенициллины полусинтетические

Больной 59-ти лет перенёс инфаркт миокарда. Для предупреждения тромбообразования назначена ацетилсалициловая кислота. Определите рациональную суточную дозу: (2012, № 38; ИБ)

- A. 100 мг
- B. 500 мг
- C. 1000 мг
- D. 200 мг
- E. 50 мг

К врачу обратилась больная хроническим панкреатитом с выраженными проявлениями недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Какое из приведенных лекарственных средств наиболее целесообразно назначить в данном случае? (2012, № 57)

- A. Панкреатин
- B. Дротаверин
- C. Де-нол
- D. Омепразол
- E. Ацидин-пепсин

Во время оперативного вмешательства, которое осуществлялось под местной анестезией 0,25% раствором новокаина, пациент внезапно покрылся красными пятнами, возникли интенсивное потоотделение, тахикардия, отек слизистой носа, бронхоспазм. Какова причина этого осложнения? (2012, № 58; 2014, № 57; ИБ)

- A. Аллергическая реакция немедленного типа
- B. Аллергическая реакция замедленного типа
- C. Тахифилаксия
- D. Синдром отдачи
- E. Синдром отмены

Пациенту 15-ти лет диагностирован сахарный диабет I типа. Какой антигипергликемический препарат может быть назначен в этом случае? (2012, № 59; ИБ)

- A. Инсулин
- B. Метформин
- C. Диабетон
- D. Глюренорм
- E. Глибенкламид

Какие из нижеследующих нестероидных противовоспалительных средств оказывают наименьшее повреждающее воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта? (2012, № 71; 2014, № 62; ИБ)

- A. Нимесулид
- B. Диклофенак
- C. Индометацин
- D. Пироксикам
- E. Ацетилсалициловая кислота

Какое лекарственное средство используют при остром инфаркте миокарда с целью тромболитической терапии? (2012, № 72; ИБ)

- A. Альтеплаза
- B. Ацетилсалициловая кислота
- C. Гепарин
- D. Пентоксифиллин
- E. Фраксипарин

В аптеку обратилась мама 8-ми месячного ребенка с просьбой отпустить

жаропонижающий препарат. Какой препарат необходимо рекомендовать для ребенка? (2012, № 76; ИБ)

- A. Парацетамол
- B. Ацетилсалициловая кислота
- C. Индометацин
- D. Диклофенак натрия
- E. Пироксим

К врачу обратился больной 70-ти лет по поводу повышенного артериального давления. Из анамнеза известно о наличии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Какое лекарственное средство желателно назначить данному больному? (2012, № 77; ИБ)

- A. Доксазозин
- B. Эналаприл
- C. Пропранолол
- D. Дилтиазем
- E. Лозартан

Посоветуйте больному с острым бронхитом муколитический препарат, который облегчает отхаркивание: (2012, № 84)

- A. Ацетилцистеин
- B. Глауцин
- C. Лоратадин
- D. Диклофенак натрия
- E. Дротаверина гидрохлорид

Пациент с атопическим дерматитом представлен в больнице. Какой препарат с противовоспалительным и противоаллергическим действием следует назначать данному пациенту? (2012, № 85; 2013, № 77)

- A. Преднизолон
- B. Этамид
- C. Окситоцин
- D. Инсулин
- E. Ретаболил

Для лечения атеросклероза больной в аптеке приобрел гиполипидемический препарат из группы фибратов. Назовите этот препарат: (2012, № 86)

- A. Фенофибрат
- B. Дротаверина гидрохлорид
- C. Бисакодил
- D. Спиринолактон
- E. Силибор

Мужчину 34-х лет ужалила пчела. Развился отёк Квинке. Какой препарат нужно немедленно ввести больному с целью устранения этого состояния? (2012, № 87)

- A. Адреналина гидрохлорид

- В. Натрия хлорид
- С. Платифиллина гидротартрат
- Д. Атропина сульфат
- Е. Анаприлин

Пациенту с желчнокаменной болезнью следует назначать следующий препарат для растворения холестериновых желчных камней: (2012, № 93; 2014, № 92; 2015, № 81; ИБ)

- А. Урсодезоксихолевая кислота
- В. Гамма-аминомасляная кислота
- С. Ацетилсалициловая кислота
- Д. Лимонная кислота
- Е. Мефенамовая кислота

У пожилого пациента запор, вызванный гипотонией толстого кишечника. Какой препарат следует назначать данному пациенту? (2012, № 97)

- А. Бисакодил
- В. Сульфат натрия
- С. Касторовое масло
- Д. Атропина сульфат
- Е. Новокаинамид

В процессе фармакотерапии бронхита у больного возникли диспептические расстройства, фотодерматит, нарушение функции печени. Какой препарат из назначенных больному мог обусловить эти явления? (2012, № 102)

- А. Доксициклин
- В. Парацетамол
- С. Кислота аскорбиновая
- Д. Ацетилцистеин
- Е. Кодеина фосфат

У больного хронический гастрит тип А со сниженной секреторной функцией, пернициозная анемия. Какой из препаратов показан больному? (2012, № 107)

- А. Цианокобаламин
- В. Аскорбиновая кислота
- С. Унитиол
- Д. Феррум лек
- Е. Оксиферрискорбон

Антидотная терапия при отравлении неорганическими соединениями ртути осуществляется использованием препарата: (2012, № 148; 2016, № 94; ИБ)

- А. Унитиол
- В. Налоксон
- С. Тетацин кальция
- Д. Десферал
- Е. Дексаметазон

Пациент принимает изосорбид для профилактики стенокардии в течение длительного времени. Сейчас он отмечает значительное снижение эффекта препарата. Как называется это явление? (2012, № 149)

- A. Толерантность
- B. Кумуляция
- C. Физическая зависимость
- D. Аллергия
- E. Потенцирование

Пациенту с инфарктом миокарда была сделана внутривенная инъекция антикоагулянта прямого действия. Выберите его среди перечисленных препаратов: (2012, № 151)

- A. Гепарин
- B. Неодикумарин
- C. Викасол
- D. Тромбин
- E. Глюконат кальция

Какой препарат с антагонистическим эффектом можно использовать для остановки кровотечения, вызванного длительным применением неодикумарина? (2012, № 163)

- A. Викасол
- B. Аминокапроновая кислота
- C. Этамзилат
- D. Фибриноген
- E. Аскорбиновая кислота

Какой анальгезирующий, противовоспалительный препарат с наименьшим повреждающим действием на желудок можно рекомендовать пациенту с обострением ревматоидного артрита? (2012, № 167)

- A. Целекоксиб
- B. Диклофенак натрия
- C. Ацетилсалициловая кислота
- D. Ибупрофен
- E. Индометацин

Препаратом выбора для терапии острого пиелонефрита у беременной женщины в I триместре является: (2012, № 172; 2014, № 72; ИБ)

- A. Амоксициллин
- B. Норфлоксацин
- C. Бисептол
- D. Гентамицин
- E. Хлорамфеникол

У мужчины, который длительное время болеет хроническим гепатитом, установлен диагноз пневмонии. Какое из антибактериальных лекарственных средств можно использовать в данной клинической ситуации? (2012, № 173; ИБ)

- A. Амоксициллин
- B. Тетрациклин
- C. Бисептол
- D. Рифампицин
- E. Ванкомицин

Какое из нижеприведенных лекарственных средств является препаратом выбора для профилактики возникновения приступов бронхиальной астмы? (2012, № 177; 2014, № 132; ИБ)

- A. Кромолин-натрий
- B. Сальбутамол
- C. Дротаверин
- D. Димедрол
- E. Амброксол

Больной 24-х лет страдает сахарным диабетом I типа в течение 8-ми лет. На почве диабетической нефропатии развилась симптоматическая артериальная гипертензия. Какой из приведенных препаратов показан для длительной терапии? (2012, № 188; ИБ)

- A. Эналаприл
- B. Пропранолол
- C. Клофелин
- D. Дибазол
- E. Дихлотиазид

Для лечения гипертонической болезни назначают диуретики. Какой диуретик **НЕ ТРЕБУЕТ** сочетания с препаратами калия? (2012, № 192; ИБ)

- A. Триамтерен
- B. Клопамид
- C. Дихлотиазид
- D. Фуросемид
- E. Этакриновая кислота

Всасывание препаратов тетрациклина снижается, когда они вводятся одновременно с антацидами. Это пример: (2012, № 185)

- A. Фармакокинетической несовместимости
- B. Фармацевтической несовместимости
- C. Фармакодинамической несовместимости
- D. Синергизма лекарственных средств
- E. Функционального антагонизма лекарств

Пациенту, который принимал фенобарбитал в течение длительного времени, назначали диклофенак натрия. Однако противовоспалительный эффект диклофенака оказался менее ожидаемым из-за фармакокинетического взаимодействия этих лекарств. Такое взаимодействие может быть результатом следующих процессов: (2012, № 200)

- A. Ускоренный метаболизм препарата в печени

- В. Замедленный метаболизм препарата в печени
- С. Снижение концентрации белка в плазме
- Д. Изменение чувствительности рецепторов
- Е. Увеличение дозировки препарата

Бензатин бензилпенициллин является препаратом выбора для лечения следующего заболевания: **(2012, № 128; ИБ)**

- А. Сифилис
- В. Кишечная инфекция
- С. Пневмония
- Д. Тонзиллит
- Е. Фурункулез

Пациенту с умеренно тяжелой пневмонией назначали цефтриаксон 1 раз в день. Препарат следует принимать один раз в день из-за его следующего свойства: **(2012, № 176; ИБ)**

- А. Медленное выделение
- В. Наличие бактерицидного действия
- С. Широкий спектр действия
- Д. Способность к кумуляции
- Е. Плохое всасывание из места инъекции

Пациент с пептической язвой отмечает черное окрашивание стула во время комбинированной фармакотерапии. Назовите препарат, который может быть причиной этого: **(2012, № 171; 2015, № 113; 2016, № 146)**

- А. Висмута субцитрат
- В. Фамотидин
- С. Омепразол
- Д. Лансопризол
- Е. Ранитидин

Какой из антигипертензивных препаратов обладает калийсберегающим действием? **(2013, № 20; 2014, № 33; ИБ)**

- А. Триамтерен
- В. Фуросемид
- С. Празозин
- Д. Метопролол
- Е. Дилтиазем

Лозартан противопоказан для лечения артериальной гипертензии в случае: **(2013, № 6; 2014, № 8; ИБ)**

- А. Беременность
- В. Гипергликемия
- С. Мочекислый диатез
- Д. Гиперлипидемия
- Е. Гипокалиемия

38-летний мужчина с интоксикацией хлоридом ртути был доставлен в приемное отделение в тяжелом состоянии. Какое противоядие должно быть немедленно введено пациенту? (2013, № 9)

- A. Унитиол
- B. Дипироксим
- C. Атропин
- D. Налоксон
- E. Изонитрозин

Через 6 месяцев после лечения у пациента с ишемической болезнью сердца развилась толерантность к нитратам пролонгированного действия. Какой препарат с нитратоподобным действием следует рекомендовать в этом случае? (2013, № 5; ИБ)

- A. Молсидомин
- B. Нифедипин
- C. Празозин
- D. Верапамил
- E. Метопролол

67-летний пациент с хронической сердечной недостаточностью принимает дигоксин. Для уменьшения побочных эффектов врач рекомендовал больному комбинировать его со следующим препаратом: (2013, № 59)

- A. Панангин
- B. Кальция глюконат
- C. Эуфиллин
- D. Гидрохлортиазид
- E. Хлорид кальция

Женщина, которая давно лечится по поводу инфильтративного очагового туберкулеза, жалуется на острое нарушение слуха. Какой из следующих препаратов может быть причиной такого побочного эффекта? (2013, № 61; 2015, № 63; ИБ)

- A. Стрептомицин
- B. Изониазид
- C. Этамбутол
- D. Рифампицин
- E. Этионамид

Какой препарат можно рекомендовать для симптоматического лечения мышечной боли у 5-летнего ребенка? (2013, № 68)

- A. Парацетамол
- B. Ацетилсалициловая кислота
- C. Диклофенак натрия
- D. Индометацин
- E. Целекоксиб

Пациенту, страдающему аллергическим ринитом, был назначен эфедрин в виде капель в нос. Пациент значительно лучше себя чувствовал после носовой инстилляцией, и это стимулировало его использовать препарат каждые 2 часа. Но в этих условиях препарат



оказался неэффективным. Какова наиболее вероятная причина этого явления? (2013, № 129)

- A. Тахифилаксия
- B. Наркотическая зависимость
- C. Идиосинкразия
- D. Аллергия
- E. Кумуляция

Суматриптан был назначен 25-летнему пациенту с частыми приступами мигрени. Укажите механизм его действия: (2013, № 134; 2015, № 118; 2016, № 104; ИБ)

- A. Селективный агонист 5-HT<sub>1</sub>-серотониновых рецепторов
- B. Селективный антагонист 5-HT<sub>1</sub>-серотониновых рецепторов
- C. Неселективный β-блокатор
- D. Стимулятор β-адренергических рецепторов
- E. Селективный α-блокатор

65-летний мужчина жалуется на тошноту, рвоту, летаргию, желтые пятна перед глазами. Пациент ежедневно принимает 0,25 мг дигоксина, 100 мг аспекард, 50 мг метопролола. Для какого синдрома типично данное состояние? (2013, № 138; 2014, № 139; ИБ)

- A. Гликозидная интоксикация
- B. Пищевое отравление
- C. Синдром отмены
- D. Тахифилаксия
- E. Реакция гиперчувствительности

Какой из следующих диуретиков НЕ ДОЛЖНЫ назначать пациентам с нарушенным слухом? (2013, № 173)

- A. Фуросемид
- B. Спиринолактон
- C. Клопамид
- D. Индапамид
- E. Хлорталидон

Одновременное применение парацетамола и ацетилцистеина вызывает: (2013, № 175)

- A. Уменьшение гепатотоксичности парацетамола
- B. Уменьшение противовоспалительного действия парацетамола
- C. Ингибирование абсорбции парацетамола
- D. Повышение муколитического действия ацетилцистеина
- E. Увеличение нефротоксичности парацетамола

Одновременное применение гентамицина и таблеток ацикловира увеличивает риск: (2013, № 176)

- A. Нефротоксичности
- B. Гепатотоксичности
- C. Кардиотоксичности
- D. Нейротоксичности

## Е. Вероятность аллергических реакций

Одновременное применение доксициклина гидрохлорида и пероральных контрацептивов вызывает: **(2013, № 177)**

- А. Снижение эффективности оральных контрацептивов
- В. Повышение эффективности оральных контрацептивов
- С. Повышение антибактериального эффекта доксициклина
- Д. Уменьшение антибактериального эффекта доксициклина

В случае одновременного применения метронидазола и пероральных антикоагулянтов, производных кумарина, необходимо предупредить пациентов о: **(2013, № 178; 2014, № 169; ИБ)**

- А. Потенцировании эффекта антикоагулянтов и риске кровотечения
- В. Уменьшении эффекта антикоагулянтов
- С. Потенцировании эффекта метронидазола
- Д. Снижении эффекта метронидазола
- Е. Более высокой нейротоксичности

70-летний пациент со стенокардией утверждает, что провизор отпустил ему лекарство, которое облегчило приступ стенокардии, но вместо этого вызвало острую распирающую головную боль. Какой антигипертензивный препарат является типичным для этого побочного эффекта? **(2013, № 183; 2016, № 127)**

- А. Нитросорбид
- В. Амлодипин
- С. Нифедипин
- Д. Триметазидин
- Е. Метопролол

43-летнему пациенту с тяжелой формой ревматоидного артрита было назначено лекарственное средство для базовой терапии. Укажите этот препарат: **(2013, № 135; 2015, № 119; ИБ)**

- А. Метотрексат
- В. Диклофенак натрия
- С. Нимесулид
- Д. Преднизолон
- Е. Метилпреднизолон

Бронхорасширяющий эффект агониста  $\beta_2$ -адренорецепторов короткого действия – сальбутамола – развивается через: **(2013, № 144; 2016, № 109; ИБ)**

- А. 5-10 минут
- В. 20-30 минут
- С. 45-60 минут
- Д. 2-3 часа
- Е. 4-6 часов

Беременная 12 недель была госпитализирована с симптомами острого цистита. Какой антибиотик можно рекомендовать в этом случае? **(2013, № 145; 2016, № 110)**

- А. Амоксициллин
- В. Ципрофлоксацин
- С. Гентамицин
- Д. Метронидазол
- Е. Тетрациклин

35-летнему пациенту с тахикардией назначили пропранолол. Какой побочный эффект может быть вызван применением бета-блокаторов? (2013, № 167)

- А. Бронхоспазм
- В. Наркотическая зависимость
- С. Кумуляция
- Д. Повышение артериального давления
- Е. Запор

17-летний пациент жалуется на постоянную жажду, сухость во рту, частое мочеиспускание, повышенный аппетит. Уровень глюкозы в крови составляет 11 ммоль/л. Пациенту был поставлен диагноз сахарного диабета I типа. Какой препарат показан для лечения? (2013, № 169)

- А. Инсулин
- Б. Манинил
- С. Глибенкламид
- Д. Акарбоза
- Е. Аспаркам

Помогите врачу выбрать препарат для заместительной терапии после удаления щитовидной железы: (2013, № 40)

- А. L-тироксин
- В. Инсулин
- С. Преднизолон
- Д. Паратиреоидин
- Е. Мерказолил

Какое лекарство наиболее оптимальное для лечения ринита, сопровождающего ОРВИ, у 7-месячного ребенка? (2014, № 73; ИБ)

- А. 0,9% -ный раствор NaCl в теплой воде
- В. Нафтизин
- С. Галазолин
- Д. Пиносол
- Е. Мазь «Бороментол»

60-летняя пациентка с артериальной гипертензией II стадии, ишемической болезнью, бронхиальной астмой. После коррекции фармакотерапии пациентка отмечает бронхоспастическую атаку, усилилась одышка. Какой препарат спровоцировал это осложнение? (2014, № 67; 2015, № 61; 2016, № 57; ИБ)

- А. Пропранолол
- В. Нифедипин
- С. Аминофиллин

- D. Мукалтин
- E. Сальбутамол

40-летний пациент страдает бронхиальной астмой и нарушением сердечного ритма в виде брадиаритмии. Препараты какой фармакологической группы должны быть назначены для устранения бронхоспазма? (2014, № 200)

- A. М-холинергические антагонисты
- B. Бета-блокаторы
- C. М-холиномиметики
- D. Ингибиторы холинэстеразы
- E. Миоелаксанты

Выберите оптимальный антибактериальный препарат для лечения микоплазменной пневмонии: (2014, № 47; ИБ)

- A. Ровамицин
- B. Гентамицин
- C. Пенициллин
- D. Ампициллин
- E. Амоксиклав

Пациенту с артериальной гипертензией назначали диуретик в составе комбинированной терапии. Применяемый препарат вызывал гипокалиемию. Укажите этот препарат: (2014, № 164; 2015, № 137; ИБ)

- A. Гидрохлоротиазид
- B. Амилорид
- C. Спиринолактон
- D. Аллопуринол
- E. Триамтерин

Какой препарат может вызвать запор у пациента, принимающего комбинированную терапию при артериальной гипертензии? (2014, № 74; ИБ)

- A. Верапамил
- B. Фуросемид
- C. Триметазидин
- D. Панангин
- E. Ацетилсалициловая кислота в малых дозах

46-летний пациент, страдающий хроническим бронхитом, обратился в аптеку. Какой отхаркивающий препарат можно рекомендовать? (2014, № 38)

- A. Амброксол
- B. Фалиминт
- C. Глаувент
- D. Либексин
- E. Сальбутамол

25-летний пациент принимает антибиотики в течение 7 дней. Антибиотикотерапия вызвала осложнение в виде дисбактериоза кишечника. Это осложнение следует лечить

препаратами следующей фармакологической группы: (2014, № 130; ИБ)

- A. Пробиотики
- B. Спазмолитики
- C. Желчегонные
- D. Антациды
- E. Адаптогены

С чего наиболее целесообразно начинать лечение больного, у которого впервые развился приступ бронхиальной астмы? (2015, № 82)

- A. Ингаляции  $\beta_2$ -адреномиметика
- B. Ингаляции глюкокортикостероида
- C. Адреномиметики парентерально
- D. М-холинолитики
- E.  $H_2$ -гистаминоблокаторы

К провизору обратился пациент, которому рекомендован приём ацетилсалициловой кислоты как антиагреганта. Какую суточную дозу в граммах следует рекомендовать для постоянного приёма? (2015, № 97)

- A. 0,1-0,3
- B. 0,5-1,0
- C. 1,0-2,0
- D. 2,0-3,0
- E. Более 4,0 98.

У больного с артериальной гипертензией и хроническим бронхитом внезапно возник сухой кашель, одышка; температура тела не изменилась. Известно, что больной принимает каптоприл. Этот феномен можно объяснить увеличением образования: (2015, № 98)

- A. Брадикинина
- B. Ангиотензина I
- C. Ренина
- D. Альдостерона
- E. Na-уретического пептида

Больной, которая болеет бронхиальной астмой, установлен диагноз гипертонической болезни. Какой гипотензивный препарат ПРОТИВОПОКАЗАН данной пациентке? (2015, № 114)

- A. Анаприлин
- B. Каптоприл
- C. Амлодипин
- D. Гипотиазид
- E. Верапамил

Больной 57-ми лет установлен диагноз ревматоидного артрита, в анамнезе язвенная болезнь. Какой препарат из группы нестероидных противовоспалительных препаратов можно рекомендовать данной больной? (2015, № 115)

- A. Целекоксиб

- В. Диклофенак
- С. Аспирин
- Д. Индометацин
- Е. Мефенамовая кислота

Какой из нижеприведенных препаратов является препаратом выбора для профилактики возникновения приступов бронхиальной астмы? (2015, № 116)

- А. Кромолин-натрий
- В. Сальбутамол
- С. Дротаверин
- Д. Димедрол
- Е. Амброксол

Какой препарат показан при передозировке миорелаксантами деполяризующего типа действия? (2015, № 117)

- А. Прозерин
- В. Метопролол
- С. Налоксон
- Д. Магния сульфат
- Е. Унитиол

Больному 30-ти лет с диагнозом острого остеомиелита назначили антибиотик, который хорошо проникает в костную ткань. Какое средство было выбрано? (2015, № 142)

- А. Линкомицин
- В. Бициллин-3
- С. Бензилпенициллин
- Д. Полимиксин-М

Больному 46-ти лет диагностирован инфаркт миокарда. Какое лекарственное средство необходимо назначить для проведения тромболитической терапии? (2015, № 163)

- А. Стрептокиназа
- В. Нитроглицерин
- С. Верошпирон
- Д. Дротаверина гидрохлорид
- Е. Промедол

У больного тромбофлебитом нижних конечностей возникли признаки передозирования гепарина. Какой препарат целесообразно использовать как антидот? (2015, № 164)

- А. Протамина сульфат
- В. Фенилин
- С. Дипиридамол
- Д. Пентоксифиллин
- Е. Теофиллин

Какой из приведенных препаратов является антидотом при неотложной помощи при

острых отравлениях соединениями мышьяка, ртути, хрома, висмута? (2015, № 165)

- A. Унитиол
- B. Преднизолон
- C. Атропин
- D. Адреналин
- E. Морфин

Мужчина 59-ти лет длительное время использует фуросемид для лечения сердечной недостаточности. Какое лекарственное средство для профилактики гипокалиемии необходимо использовать в данном случае? (2015, № 166; 2016, № 160)

- A. Панангин
- B. Тиотриазолин
- C. Ацетилсалициловая кислота
- D. Триметазидин
- E. Эналаприл

У женщины 32-х лет, которая для лечения пневмонии получала антибиотикотерапию, возник дисбактериоз кишечника. Какие препараты следует назначить больной? (2015, № 167; 2016, № 161)

- A. Пробиотики
- B. Иммуномодуляторы
- C. Желчегонные
- D. Антациды
- E. Спазмолитики

Женщина 53-х лет болеет ишемической болезнью сердца, стенокардией. Какое лекарственное средство используется для снятия приступа стенокардии? (2015, № 168)

- A. Нитроглицерин
- B. Дротаверина гидрохлорид
- C. Пропранолол
- D. Дипиридамол
- E. Ацетилсалициловая кислота

Больной 20 лет. После того, как её ужалила оса развился отёк Квинке; на туловище появилась сыпь в виде пузырей, папул. Назовите препарат, с которого нужно начинать неотложную помощь: (2015, № 169)

- A. Преднизолон
- B. Пенициллин
- C. Свежезамороженная плазма
- D. Реополиглюкин
- E. Гемодез

Больному с остеоартрозом (гонартроз) и пептической язвой желудка в анамнезе необходимо назначить нестероидное противовоспалительное средство. Выберите наиболее безопасный для этого пациента препарат: (2015, № 170)

- A. Мелоксикам
- B. Ацетилсалициловая кислота

- C. Ибупрофен
- D. Индометацин
- E. Метамизол натрия

Мужчина 20-ти лет болен хроническим гастритом с повышенной секреторной функцией (тип В). Выберите антисекреторное средство: **(2015, № 171)**

- A. Омепразол
- B. Дротаверина гидрохлорид
- C. Кларитромицин
- D. Левофлоксацин
- E. Метоклопрамид

У больного 45-ти лет в процессе клинико-инструментального исследования обнаружен хронический хеликобактерассоциированный гастрит (тип В). Препараты какой группы необходимо назначить больному в первую очередь? **(2015, № 172)**

- A. Антихеликобактерные средства
- B. Прокинетики
- C. Антациды
- D. Репаранты
- E. М-холинолитики

Больному, перенесшему инфаркт миокарда, рекомендуется прием ацетилсалициловой кислоты с целью: **(2016, № 4)**

- A. Уменьшения агрегации тромбоцитов
- B. Понижения температуры тела
- C. Расширения коронарных сосудов
- D. Уменьшения воспаления
- E. Снижения уровня холестерина

Объясните, почему снижается антикоагулянтный эффект синкумара при одновременном применении его с фенобарбиталом **(2016, № 42)**

- A. Фенобарбитал активирует микросомальные ферменты печени
- B. Фенобарбитал ингибирует микросомальные ферменты печени
- C. Развивается аллергия к синкумару
- D. Проявляется антагонизм этих препаратов
- E. Происходит взаимная инактивация

Пациентку 49-ти лет беспокоят периодическая сжимающая головная боль в затылочной области, головокружение, повышение артериального давления. В анамнезе сахарный диабет II типа. Какое диуретическое средство НЕ ВЛИЯЕТ на уровень глюкозы в крови? **(2016, № 106)**

- A. Индапамид
- B. Фуросемид
- C. Гипотиазид
- D. Этакриновая кислота
- E. Мочевина



Рифампицин является индуктором цитохрома Р 450, поэтому его взаимодействие с другим химически активным лекарственным средством может привести к: **(2016, № 108)**

- А. Уменьшению концентрации другого лекарственного средства
- В. Увеличению концентрации другого лекарственного средства
- С. Не влияет на концентрацию другого лекарственного средства
- Д. Связыванию с другими метаболитами
- Е. Не влияет на токсичность другого лекарственного средства

126. В приёмное отделение обратился пациент с признаками отравления морфином. Назовите антидот: **(2016, № 126)**

- А. Налоксон
- В. Колларгол
- С. Эссенциале
- Д. Эктерицид
- Е. Трентал

Женщина 48-ми лет обратилась к провизору аптеки, жалуясь на появление запора после начала лечения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Назовите лекарственный препарат, замедляющий перистальтику кишечника: **(2016, № 141)**

- А. Верапамил
- В. Фолиевая кислота
- С. Лозартан
- Д. Аскорбиновая кислота
- Е. Эналаприл

У мальчика 5-ти лет, страдающего пневмонией, очень тяжело отходит мокрота. Врач назначил препарат из группы муколитиков, стимулирующий синтез сурфактанта. Какой это препарат? **(2016, № 145)**

- А. Амброксол
- В. Карбоцистеин
- С. Мукалтин
- Д. Ацетилцистеин
- Е. Йодид калия

Больной 43-х лет обратился в приёмное отделение с приступом почечной колики. Какая из перечисленных групп препаратов является наиболее эффективной при таком приступе? **(2016, № 147)**

- А. Спазмолитики
- В. Гепатопротекторы
- С. Антациды
- Д. Антибиотики
- Е. Желчегонные

В аптеку обратился водитель автобуса по поводу аллергического ринита. Посоветуйте антигистаминное средство с наименьшим седативным эффектом: **(2016, № 148)**

- А. Лоратадин
- В. Клемастин
- С. Астемизол
- Д. Дифенгидрамин
- Е. Хлоропирамин

У больного 36-ти лет возникли жалобы на общую слабость, сонливость, повышенную ломкость ногтей, выпадение волос. Диагностирована железодефицитная анемия.

Какой препарат показан для лечения? **(2016, № 150)**

- А. Железа сульфат
- В. Цианокобаламин
- С. Фолиевая кислота
- Д. Миелосан
- Е. Рибоксин

Какой из приведенных гипотензивных средств является препаратом выбора у больных артериальной гипертензией с сопутствующим сахарным диабетом I типа? **(2016, № 151)**

- А. Лизиноприл
- В. Гипотиазид
- С. Атенолол
- Д. Лабеталол
- Е. Карведилол

Больной гипертонической болезнью жалуется на сухой кашель, который изредка беспокоит. Клиническое и рентгенологическое исследование органов дыхания патологии не обнаружило. Побочное действие какого из препаратов, которые принимает больной, может быть причиной кашля? **(2016, № 156)**

- А. Каптоприл
- В. Дилтиазем
- С. Гидрохлортиазид
- Д. Небиволол
- Е. Престариум

Больному 46-ти лет диагностирован инфаркт миокарда. Какое лекарственное средство необходимо назначить для проведения тромболитической терапии? **(2016, № 159)**

- А. Стрептокиназа
- В. Нитроглицерин
- С. Верошпирон
- Д. Дротаверина гидрохлорид
- Е. Промедол

Женщина 53-х лет болеет ишемической болезнью сердца, стенокардией. Какое лекарственное средство используется для снятия приступа стенокардии? **(2016, № 162)**

- А. Нитроглицерин
- В. Дротаверина гидрохлорид
- С. Пропранолол

- D. Дипиридамол
- E. Ацетилсалициловая кислота

Больной 20 лет. После того, как её ужалила оса развился отёк Квинке; на туловище появилась сыпь в виде пузырей, папул. Назовите препарат, с которого нужно начинать неотложную помощь: **(2016, № 163)**

- A. Преднизолон
- B. Пенициллин
- C. Свежезамороженная плазма
- D. Реополиглюкин
- E. Гемодез

Больному с остеоартрозом (гонартроз) и пептической язвой желудка в анамнезе необходимо назначить нестероидное противовоспалительное средство. Выберите наиболее безопасный для этого пациента препарат: **(2016, № 164)**

- A. Мелоксикам
- B. Ацетилсалициловая кислота
- C. Ибупрофен
- D. Индометацин
- E. Метамизол натрия

Мужчина 20-ти лет болеет хроническим гастритом с повышенной секреторной функцией (тип В). Выберите антисекреторное средство: **(2016, № 165)**

- A. Омепразол
- B. Дротаверина гидрохлорид
- C. Кларитромицин
- D. Левофлоксацин
- E. Метоклопрамид

У больного 45-ти лет в процессе клинико-инструментального исследования обнаружен хронический хеликобактерассоциированный гастрит (тип В). Препараты какой группы необходимо назначить больному в первую очередь? **(2016, № 166)**

- A. Антихеликобактерные средства
- B. Прокинетики
- C. Антациды
- D. Репаранты
- E. М-холинолитики

Больная 48-ми лет после частичного удаления щитовидной железы. Выберите средство для заместительной терапии при гипотиреозе: **(2016, № 184)**

- A. L-тироксин
- B. Гидрокортизон
- C. Инсулин
- D. Метопролол
- E. Преднизолон

186. Больная 34-х лет, страдающая системной красной волчанкой, принимает

метилпреднизолон. При обследовании обнаружен низкий уровень кальция в крови. Врач предположил развитие остеопороза. Больной необходимо назначить препараты кальция и: **(2016, № 186)**

- A. Витамин D<sub>3</sub>
- B. Витамины группы B
- C. Витамин C
- D. Витамин A
- E. Витамин E

У больного 52-х лет диагноз: подагрический артрит, 2 фаза активности. Какой препарат является базисным для лечения больного? **(2016, № 189)**

- A. Аллопуринол
- B. Гидрохлортиазид
- C. Парацетамол
- D. Фуросемид
- E. Пенициллин