

**Тестові завдання з клінічної фармації
із буклетів 2012-2016 рр.
(вірний варіант відповіді – А – у всіх завданнях)**

1. Який з нижченаведених лікарських засобів застосовується при інфаркті міокарда для проведення тромболітичної терапії?
 - A. Стрептокіназа
 - B. Гепарин
 - C. Фенілін
 - D. Тиклопідин
 - E. Ацетилсаліцилова кислота

2. Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?
 - A. Бензилпеніцилін
 - B. Гентаміцин
 - C. Сульфален
 - D. Левоміцетин
 - E. Офлоксацин

3. Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск у хворого нормалізувався, однак його почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?
 - A. Еналаприлу малеат
 - B. Анаприлін
 - C. Клофелін
 - D. Фуросемід
 - E. Ніфедипін

4. Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом:
 - A. Фенобарбітал активує мікосомальні ферменти печінки
 - B. Фенобарбітал інгібує мікосомальні ферменти печінки
 - C. Розвивається алергія до синкумару
 - D. Проявляється антагонізм цих препаратів
 - E. Відбувається взаємна інактивація

5. У хворого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому?
 - A. Ціанокобаламін
 - B. Адреналін
 - C. Дифенгідрамін
 - D. Вікалін
 - E. Дротаверин

6. Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії?
- A. Альтеплаза
 - B. Ацетилсаліцилова кислота
 - C. Гепарин
 - D. Пентоксифілін
 - E. Фраксипарин
7. Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення?
- A. Пропранолол
 - B. Ніфедипін
 - C. Еуфілін
 - D. Мукалтин
 - E. Сальбутамол
8. У хворого 60-ти років після емоційного перенапруження з'явився біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Назвіть лікарський засіб, який тамує больовий синдром у даному випадку:
- A. Нітрогліцерин
 - B. Ніфедипин
 - C. Дилтіазем
 - D. Пропранолол
 - E. Метопролол
9. До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому?
- A. Доксазозин
 - B. Еналаприл
 - C. Пропранолол
 - D. Дилтіазем
 - E. Лозартан
10. Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки у I триместрі є:
- A. Амоксицилін
 - B. Норфлуксацин
 - C. Бісептол
 - D. Гентаміцин
 - E. Хлорамфенікол
11. У вагітної жінки 38-ми років хворої на цукровий діабет II типу (інсулінонезалежний) препаратом вибору є:
- A. Інсулін

- В. Глібенкламід
- С. Метформін
- Д. Толбутамід
- Е. Бутформін

12. Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепи в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії?

- А. Верапаміл
- В. Фуросемід
- С. Триметазідін
- Д. Панангін
- Е. Ацетилсаліцилова кислота в малих дозах

13. Жінка у III триместрі вагітності захворіла на ГРВІ з підвищенням температури тіла до 39⁰С. Який лікарський засіб доцільно їй запропонувати?

- А. Парацетамол
- В. Целекоксиб
- С. Індометацин
- Д. Ацетилсаліцилова кислота
- Е. Диклофенак натрію

14. До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу препарату у грамах слід рекомендувати для постійного прийому?

- А. 0,1-0,3
- В. 0,5-1,0
- С. 1,0-2,0
- Д. 2,0-3,0
- Е. Більше 4,0

15. Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли брадикардія, нудота, блювання, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку?

- А. Унітіол
- В. Тетацин-кальцій
- С. Дипіроксам
- Д. Амлінітрит
- Е. Атропіну сульфат

16. У хворого на виразкову хворобу шлунка під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну:

- А. Вісмуту субцитрат
- В. Омепразол
- С. Актовегін
- Д. Метронідазол

Е. Ранітидин

17. У чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації?

- А. Амоксицилін
- В. Тетрациклін
- С. Бісептол
- Д. Рифампіцин
- Е. Ванкоміцин

18. Який з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми?

- А. Кромолін-натрій
- В. Сальбутамол
- С. Дротаверин
- Д. Димедрол
- Е. Амброксол

19. У хворого на ІХС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку?

- А. Молсидомін
- В. Ніфедипін
- С. Празозин
- Д. Верапаміл
- Е. Метопролол

20. Який препарат є специфічним антидотом під час отруєння препаратами заліза?

- А. Дефероксамін
- В. Протаміну сульфат
- С. Бемегрид
- Д. Атропіну сульфат
- Е. Пеніциламін

21. Вагітна захворіла на пневмонію з важким перебігом. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити:

- А. Цефотаксим
- В. Гентаміцину сульфат
- С. Тетрацикліну гідрохлорид
- Д. Офлоксацин
- Е. Бісептол

22. В аптеку звернулася мати 2-місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат слід рекомендувати для дитини?

- A. Парацетамол
- B. Німесулід
- C. Ацетилсаліцилову кислоту
- D. Індометацин
- E. Диклофенак натрію

23. Дитина 6-ти років захворіла на пневмонію, з приводу якої був призначений антибіотик. Після лікування дитина втратила слух. Яка група антибіотиків могла викликати це ускладнення?

- A. Аміноглікозиди
- B. Цефалоспорини
- C. Макроліди
- D. Пеніциліни природні
- E. Пеніциліни напівсинтетичні

24. Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який антигіпертензивний препарат вона використовувала?

- A. Лізиноприл
- B. Атенолол
- C. Ніфедипін
- D. Фуросемід
- E. Дихлотіазид

25. До лікаря звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Який з наведених лікарських засобів найдоцільніше призначати в даному випадку?

- A. Панкреатин
- B. Дротаверин
- C. Де-нол
- D. Омепразол
- E. Ацидин-пепсин

26. У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити?

- A. Дексаметазон
- B. Диклофенак натрію
- C. Ібупрофен
- D. Делагіл
- E. Левамизол

27. Хворому 54-х років, який кілька років страждає на хронічний гіперацидний гастрит, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все?

- A. Закрепи
- B. Нудота

- C. Анорексія
- D. Блювання
- E. Діарея

28. У хворої 26-ти років діагностовано позагоспітальну пневмонію, спричинену мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб для лікування хворої:

- A. Роваміцин
- B. Амоксицилін
- C. Гентаміцин
- D. Бензілпеніцилін
- E. Амоксиклав

29. Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення?

- A. Пропранолол
- B. Ніфедипін
- C. Еуфілін
- D. Мукалтин
- E. Сальбутамол

30. Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує дигоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з наступним препаратом:

- A. Панангін
- B. Глюконат кальцію
- C. Еуфілін
- D. Дихлотіазид
- E. Кальцію хлорид

31. У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію?

- A. Стрептоміцин
- B. Ізоніазид
- C. Етамбутол
- D. Рифампіцин
- E. Етіонамід

32. Яка з вказаних фармакологічних груп препаратів антигіпертензивної дії протипоказана хворим з бронхіальною астмою?

- A. β -адреноблокатори
- B. Інгібітори АПФ
- C. Блокатори кальцієвих каналів
- D. Блокатори ангіотензинових рецепторів

Е. Діуретики

33. Для усунення нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?

- А. Сублінгвальний
- В. Пероральний
- С. Ректальний
- Д. Інгаляційний
- Е. Підшкірний

34. Чоловіка 34-х років вжалила бджола. Розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?

- А. Адреналіну гідрохлорид
- В. Натрію хлорид
- С. Платифіліну гідротартрат
- Д. Атропіну сульфат
- Е. Анаприлін

35. Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат:

- А. Гепарин
- В. Фенілін
- С. Синкумар
- Д. Неодикумарин
- Е. Вікасол

36. У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища?

- А. Доксциклін
- В. Парацетамол
- С. Кислота аскорбінова
- Д. Ацетилцистеїн
- Е. Кодеїну фосфат

37. Хворий 24-х років страждає на цукровий діабет I типу впродовж 8-ми років. На ґрунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії?

- А. Еналаприл
- В. Пропранолол
- С. Клофелін
- Д. Дибазол
- Е. Дихлотиазид

38. Відпускаючи з аптеки препарат заліза для приймання внутрішньо – фероплекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом з ним молочні продукти, оскільки при цьому:

- A. Утворюються малорозчинні хелатні комплекси
- B. Пролонгується дія препаратів заліза
- C. Підсилюється активність препарату
- D. Швидше всмоктується препарат
- E. Прискорюється виведення препарату

39. Виберіть із перерахованих захворювань ті, які можуть лікуватися за допомогою ОТС-препаратів при консультативній допомозі провізора:

- A. Гостре респіраторне захворювання
- B. Рак легень
- C. Ексудативний плеврит
- D. Бронхіальна астма
- E. Гостра пневмонія

40. В аптеку звернулася вагітна жінка з гарячкою. Порекомендуйте найбільш безпечний препарат:

- A. Парацетамол
- B. Диклофенак
- C. Ацетилсаліцилова кислота
- D. Ібупрофен
- E. Індометацин

41. Хворий з загостренням хронічного бронхіту приймає амброксолу гідрохлорид, калію йодид, аскорутин, теофілін, бісептол. Через 8 днів у нього з'явилася вугреподібна висипка на шкірі, гострий риніт та болісний набряк слинних залоз. Проконсультуйте лікаря, який із препаратів міг викликати вказані симптоми:

- A. Калію йодид
- B. Амброксолу гідрохлорид
- C. Бісептол
- D. Аскорутин
- E. Теофілін

42. Для ерадикації *Helicobacter pylori* до комбінованої терапії хронічного гастриту доцільно включити:

- A. Кларитроміцин
- B. Гастроцепін
- C. Альмагель
- D. Цефтриаксон
- E. Фуросемід

43. У хворого 30 років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених препаратів має нефротоксичну дію?

- A. Гентаміцин

- В. Еритроміцин
- С. Ампіцилін
- Д. Роваміцин
- Е. Пеніцилін

44. Який з названих антибіотиків частіше викликає ураження печінки?

- А. Тетрациклін
- В. Роваміцин
- С. Феноксиметилпеніцилін
- Д. Цефазолін
- Е. Еритроміцин

45. У хворої 36 років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати у даному випадку?

- А. Рокситроміцин
- В. Ампіцилін
- С. Пеніцилін
- Д. Цефуросим
- Е. Ванкоміцин

46. Хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки для ерадикації хелікобактерної інфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути у хворого?

- А. Дисбактеріоз
- В. Кишкова кровотеча
- С. Зниження артеріального тиску
- Д. Бронхоспазм
- Е. Підвищення секреції соляної кислоти

47. Ви - провізор аптеки, що розташована у жіночій консультації. Дайте відповідь на питання лікаря-інтерна, який з наявних препаратів антимикробної дії можна призначити вагітній?

- А. Ампіцилін
- В. Ко-тримоксазол
- С. Доксициклін
- Д. Окситетрациклін
- Е. Гентаміцин

48. У хворої з гіпертонічною хворобою II ст. після тривалого приймання пропранололу, ніфедипіну та дихлотіазиду з'явилися судоми у м'язах нижніх кінцівок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом міг бути спричинений цей стан?

- А. Дихлотіазидом
- В. Пропранололом
- С. Дихлотіазидом та пропранололом
- Д. Пропранололом та ніфедипіном

Е. Не пов'язаний з прийманням цих ліків

49. У наслідок необачливої поведінки біля пасіки, дитина була ужалена декількома бджолами у різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги?

- А. Дифенгідрамін (дімедрол)
- В. Адреналін
- С. Метамізол (анальгін)
- Д. Еритроміцин
- Е. Фуросемід

50. Порадьте хворому з гострим бронхітом муколітичний препарат, що полегшує відхаркування:

- А. Ацетилцистеїн
- В. Парацетамол
- С. Лоратадин
- Д. Диклофенак натрію
- Е. Дротаверину гідрохлорид

51. Дитина, яка отримувала антибіотики протягом 7 днів стала скаржитися на запаморочення, погіршення слуху. Антибіотики якої групи можуть викликати цей побічний ефект?

- А. Аміноглікозиди
- В. Пеніциліни
- С. Макроліди
- Д. Тетрацикліни
- Е. Цефалоспорини

52. У хворої 69 років артеріальна гіпертензія, спровокована стресом. На момент огляду: АТ- 170/100 мм рт.ст., ЧСС-90/хв. Який препарат краще призначити в цьому випадку?

- А. Пропранолол
- В. Каптоприл
- С. Фуросемід
- Д. Дибазол
- Е. Празозин

53. Який середній термін проведення ерадикаційної терапії інфекції *Helicobacter pylori* при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки?

- А. 7-10 днів
- В. 1-2 дні
- С. 3-5 днів
- Д. 11-14 днів
- Е. 15-20 днів

54. Який показник загального аналізу крові є непрямом ознакою алергічного характеру захворювання?

- A. Еозинофілія
- B. Лейкоцитоз
- C. Анемія
- D. Тромбоцитопенія
- E. Моноцитоз

55. Хворому 56 років з діагнозом хронічний гастрит типу А показана патогенетична терапія, а саме:

- A. Повна замісна терапія (вітаміни, соляна кислота, ферменти)
- B. Антибактеріальна терапія, спрямована проти хелікобактер пілорі та купірування запалення
- C. Застосування засобів, що знижують кислотність, інгібіторів ферментів
- D. Антиоксидантна терапія
- E. Протизапальна терапія

56. Який больовий синдром найбільш характерний для пептичної виразки 12-палої кишки?

- A. "Голодний" біль у епігастрії
- B. "Ранній" біль у епігастрії
- C. "Оперізуючий" біль
- D. Біль у правому підребер'ї
- E. Біль у лівому підребер'ї

57. Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Який це препарат?

- A. Гепарин
- B. Ціанокобаламін
- C. Кальціюх лорид
- D. Ацетилцистеїн
- E. Вікасол

58. Хворому з метою попередження кишкового дисбактеріозу, внаслідок тривалої антибіотикотерапії, доцільно призначити:

- A. Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком, опісля - живі культури "корисних" бактерій
- B. Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком
- C. Живі культури "корисних" бактерій одночасно з антибіотиком
- D. Живі культури "корисних" бактерій після антибіотикотерапії
- E. Відповідна дієта

59. Хвора 62 років страждає на гіпертонічну хворобу II ст. (нефротичну форму), хронічний обструктивний бронхіт та виразкову хворобу 12-палої кишки. Які гіпотензивні препарати слід призначити в даному випадку?

- A. Блокатори кальцієвих каналів

- В. β -адреноблокатори
- С. α -адреноблокатори
- Д. Центральні симпатолітики
- Е. Інгібітори АПФ

60. У хворого 32 років діагностовано атипичну нозокоміальну пневмонію, яка викликана легеневою ікоплазмою. Які антибактеріальні засоби найефективніші в даному випадку?

- А. Макроліди другого покоління
- В. Природні пеніциліни
- С. Цефалоспорини третього покоління
- Д. Аміноглікозиди
- Е. Сульфаніламід

61. У хворого 52 років розвинувся набряковий синдром на фоні гострої ниркової недостатності. Який з наведених діуретиків слід застосувати в даному випадку?

- А. Фуросемід
- В. Гіпотіазид
- С. Новуріт
- Д. Тріамтерен
- Е. Спіронолактон

62. Хворому 46 років з підвищеним рівнем холестерину, тригліцеридів, β -ліпопротеїдів призначено аторвастатин по 10 мг на добу. Хворий звернувся до провізора з проханням дати пояснення про час прийому препарату. Коли краще приймати цей препарат?

- А. На ніч
- В. Вранці натщесерце
- С. Вранці після сніданку
- Д. Під час обіду
- Е. Під час вечері

63. Хворий на гострий інфаркт міокарда в складі комплексної терапії отримувал препарат-антикоагулянт. Через деякий час з'явилася гематурія. Для усунення цього ускладнення призначили протаміну сульфат. Який антикоагулянт отримувал хворий?

- А. Гепарин
- В. Амінокапронова кислота
- С. Тромбін
- Д. Фібриноген
- Е. Вікасол

64. Хворому на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки для ерадикації хелікобактерної інфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути в хворого?

- А. Дисбактеріоз
- В. Кишкова кровотеча

- C. Зниження артеріального тиску
- D. Бронхоспазм
- E. Підвищення секреції соляної кислоти

65. Який симптом НЕ характерний для ангіоневротичного набряку Квінке?

- A. Поліурія
- B. набряк губ
- C. набряк гортані
- D. Свербіж шкіри
- E. Еозинофілія

66. Для препаратів з високою ліофільністю НЕ характерно:

- A. Погане всмоктування в шлунково-кишковому тракті
- B. Добре всмоктування в шлунково-кишковому тракті
- C. Добре проникнення через гемато-енцефалічний бар'єр
- D. Метаболізм у печінці
- E. Добре проникнення через плацентарний бар'єр

67. Хворому на виразкову хворобу шлунка було призначено ранітидин (150 мг 2 рази на день), після дообстеження було виявлено хронічну ниркову недостатність (кліренс креатиніну менше 50 мл/хв). Яку корекцію слід внести в лікування даного хворого?

- A. Зменшити дозування ранітидину вдвічі та продовжити лікування
- B. Збільшити дозування ранітидину вдвічі та продовжити лікування
- C. Відмінити ранітидин, призначити циметидин
- D. Відмінити ранітидин, призначити фамотидин
- E. Ранітидин не відмінити, призначити діуретики

68. Внаслідок необачливої поведінки біля пасіки, дитина була ужалена декількома бджолами в різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги?

- A. Димедрол
- B. Адреналін
- C. Анальгін
- D. Еритроміцин
- E. Фуросемід

69. Хворому призначили препарат, на фоні застосування якого виникли наступні побічні ефекти: розвинувся стероїдний діабет, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. До якої фармакологічної групи належить цей лікарський засіб?

- A. Глюкокортикоїди
- B. Антигістамінні засоби
- C. Антибіотики
- D. Нестероїдні протизапальні засоби
- E. Протипухлинні засоби

70. Хворий страждає на ішемічну хворобою серця з серцевою недостатністю II ст. З якої комбінації препаратів слід починати лікування цього хворого?
- A. Інгібітори АПФ та діуретики
 - B. Інгібітори АПФ та антагоністи кальцію
 - C. Нітрати та діуретики
 - D. β -блокатори та діуретики
 - E. Інгібітори АПФ та нітрати
71. У хворої 36-ти років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати в даному випадку?
- A. Рокситроміцин
 - B. Ампіцилін
 - C. Пеніцилін
 - D. Цефуроксим
 - E. Ванкоміцин
72. У хворого похилого віку діагностовано госпітальну пневмонію. Лікується гентаміцином. Яка побічна дія найбільш часто зустрічається при використанні антибіотиків цієї групи?
- A. Ототоксична дія
 - B. Гематотоксична дія
 - C. Псевдомембранозний коліт
 - D. Ураження печінки
 - E. Тромбофлебіт
73. При тривалому прийомі антацидів, що містять алюміній, відзначається:
- A. Ураження кісткової тканини
 - B. Зниження слуху
 - C. Поліурія
 - D. Слиноотеча
 - E. Гіперхолестеринемія
74. Хворий придбав в аптеці нітрогліцерин. Про який найбільш поширений побічний ефект даного препарату повинен попередити провізор хворого?
- A. Головний біль
 - B. Гіпертензія
 - C. Дизурія
 - D. Сухість у роті
 - E. Гіперглікемія
75. Хворому 56-ти років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ та калійзберігаючий діуретик. Така комбінація:
- A. Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії
 - B. Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії
 - C. Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія іАПФ

- D. Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія іАПФ
- E. Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу

76. Для лікування гіпертонічної хвороби призначають діуретики. Який діуретик не вимагає сполучення з препаратами калію?

- A. Триамтерен
- B. Клопамід
- C. Дихлотіазид
- D. Фуросемід
- E. Етакринова кислота

77. Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки в I триместрі є:

- A. Амоксицилін
- B. Норфлуксацин
- C. Бісептол
- D. Гентаміцин
- E. Хлорамфенікол

78. Який найбільш раціональний препарат можна порекомендувати для лікування риніту при ГРВІ дитини у віці 7-ми місяців?

- A. 0,9% розчин повареної солі в теплій воді
- B. Нафтизин
- C. Галазолін
- D. Піносол
- E. Мазь "Бороментол"

79. Який з перерахованих антибактеріальних препаратів нераціонально призначати хворому 56-ти років з цукровим діабетом II типу, який отримує глібенкламід?

- A. Бісептол
- B. Мідекаміцин
- C. Гентаміцин
- D. Бензилпеніцилін
- E. Доксидиклін

80. Для усунення нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?

- A. Сублінгвальний
- B. Пероральний
- C. Ректальний
- D. Інгаляційний
- E. Підшкірний

81. У пацієнта після переохолодження на нижній губі з'явилися герпетичні висипання. Який препарат можна порекомендувати?

- A. Ацикловір
- B. Ітраконазол
- C. Амоксицилін
- D. Преднізолон
- E. Азидотимідин

82. З якою метою хворому, що страждає на бронхіальну астму, призначається інтал (кромолін-натрій)?

- A. Для попередження розвитку нападу бронхіальної астми
- B. Для усунення астматичного статусу
- C. Для усунення нападу бронхіальної астми
- D. Для поліпшення відходження харкотиння
- E. Для придушення кашлю

83. Для лікування пацієнта з пептичною виразкою шлунка показано застосування препарату з гастроцитопротекторною активністю. Оберіть цей препарат:

- A. Сукральфат
- B. Альмагель
- C. Ранітидин
- D. Метоклопрамід
- E. Дротаверину гідрохлорид

84. Хворому, який страждає на напади стенокардії, показано застосування нітратів тривалої дії. Вкажіть цей препарат серед перелічених:

- A. Ізосорбїду мононітрат
- B. Діазепам
- C. Аміназин
- D. Леводопа
- E. Прозерин

85. Під час відпуску в аптеці антибактеріальних препаратів для лікування позашпитальної пневмонії, дайте додаткові рекомендації хворому з приводу профілактики у нього можливого кишкового дисбактеріозу:

- A. Лінекс
- B. Тавегіл
- C. Амброксол
- D. Карсіл
- E. Ко-тримоксазол

86. Хворий 74-х років тривалий час застосовує для лікування серцевої недостатності дигоксин. З'явилися скарги на нудоту, блювання, пронос, погіршення зору. Лікар подумав про можливу інтоксикацію препаратом. Який антидот слід рекомендувати для призначення?

- A. Унітіол
- B. Кальцію хлорид
- C. Протаміну сульфат

- D. Прозерин
- E. Атропіну сульфат

87. Хворий надійшов до приймального відділення в коматозному стані. Рівень цукру в крові 25 ммоль/л. Який лікарський засіб є препаратом вибору при наданні невідкладної допомоги?

- A. Інсулін
- B. Хумулін ультраленте
- C. 40% розчин глюкози
- D. Розчин Рінгера
- E. 10% розчин глюкози

88. У хворої 67-ми років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, виникли тремор кінцівок, біль голови, безсоння, екстрасистолія. Який засіб міг зумовити такі симптоми?

- A. Теофілін
- B. Преднізолон
- C. Тавегіл
- D. Інтал
- E. Ацетилцистеїн

89. В аптеку звернулася жінка похилого віку з проханням відпустити їй лікарський засіб для зняття болю в суглобах, в анамнезі – пептична виразка шлунка. Який з наведених засобів найбільш безпечний у даному випадку?

- A. Целекоксиб
- B. Ацетилсаліцилова кислота
- C. Індометацин
- D. Диклофенак натрію
- E. Піроксикам

90. Жінка 48-м років надійшла до кардіологічного відділення з діагнозом: ІХС, стенокардія. Напади виникають 1-2 рази на день. Який препарат найбільш доцільно рекомендувати для лікування?

- A. Ізосорбїду динітрат
- B. Еуфілін
- C. Но-шпа
- D. Папаверин
- E. Дипіридамол

91. Який препарат, що відноситься до групи послаблюючих, не можна призначати при отруєннях засобами, що пригнічують ЦНС?

- A. Магнію сульфат
- B. Натрію сульфат
- C. Вазелінова олія
- D. Бісакодил
- E. Гуталакс

92. Хворому, що страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат:

- A. Омепразол
- B. Гастроцепін
- C. Маалокс
- D. Фамотидин
- E. Альмагель

93. Хвору 53-х років після фізичного навантаження почав турбувати біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Який препарат слід призначити для усунення больового нападу?

- A. Нітрогліцерин
- B. Ізосорбід 5-мононітрат
- C. Ніфедипін
- D. Метопролол
- E. Дилтіазем

94. Хворий 24-х років страждає на цукровий діабет I типу протягом 8 років. На ґрунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії?

- A. Еналаприл
- B. Пропранолол
- C. Клофелін
- D. Дибазол
- E. Дихлотиазид

95. Під час оперативного втручання, яке здійснювалось під місцевою анестезією 0,25% розчином новокаїну, пацієнт зненацька покритися червоними плямами, виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення?

- A. Алергічна реакція негайного типу
- B. Алергічна реакція сповільненого типу
- C. Тахіфілаксія
- D. Синдром віддачі
- E. Синдром відміни

96. Після тижневої фармакотерапії артеріальної гіпертензії лізиноприлом в дозі 10 мг 2 рази на добу у хворого з'явилися періодично виникаючі напади сухого кашлю. Чим це може бути зумовлене?

- A. Накопичення в крові залишку брадикініну
- B. Підвищення тону кашльового центру
- C. Загострення супутньої патології
- D. Пригнічення синтезу альдостерону
- E. Зменшення вмісту в крові адреналіну

97. Хворий 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю регулярно приймає фуросемід по 40 мг натщесерце 3 рази на тиждень. У зв'язку з поза лікарняною пневмонією лікар призначив комбіновану фармакотерапію. Через 3 доби хворий почав втрачати слух. Назвіть лікарський засіб, який при взаємодії з фуросемідом викликає глухоту:

- A. Амікацин
- B. Лінекс
- C. Тавегіл
- D. Ністатин
- E. Розчин йодистого калію

98. Хворий 59-ти років переніс інфаркт міокарда. Для попередження тромбоутворення призначена ацетилсаліцилова кислота. Визначте раціональну добову дозу:

- A. 100 мг
- B. 500 мг
- C. 1000 мг
- D. 2000 мг
- E. 3000 мг

99. Для лікування атеросклерозу хворий в аптеці придбав гіполіпідемічний препарат з групи фібратів. Назвіть цей препарат:

- A. Фенофібрат
- B. Дротаверину гідрохлорид
- C. Бісакодил
- D. Спіронолактон
- E. Силібор

100. Хворому 45-ти років з діагнозом ревматоїдний артрит та пептична виразка шлунка, необхідно призначити нестероїдні протизапальні засоби. Який препарат є найбільш доцільним?

- A. Целекоксиб
- B. Диклофенак натрію
- C. Ацетилсаліцилова кислота
- D. Індометацин
- E. Піроксикам

101. Хворому на хронічну серцеву недостатність та хронічну ниркову недостатність призначено дигоксин. Через тиждень виникли брадикардія, екстрасистолія, погіршення гостроти зору, порушення колірнього сприймання. Як Ви трактуватимете зміни у клінічній картині?

- A. Дигіталісна інтоксикація
- B. Ускладнення хронічної серцевої недостатності
- C. Ускладнення хронічної ниркової недостатності
- D. Артеріальна гіпотензія
- E. Іпохондричний синдром

102. Хворий 50-ти років протягом 20-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу з набряками та зменшенням діурезу. Який препарат необхідно призначити хворому для зниження артеріального тиску і усунення набряків?

- A. Фуросемід
- B. Резерпін
- C. Еналаприл
- D. Празозин
- E. Метилдофа

103. Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепи в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії?

- A. Верапаміл
- B. Фуросемід
- C. Триметазідін
- D. Панангін
- E. Ацетилсаліцилова кислота у малих дозах

104. Чоловік 46-ти років, хворий на хронічний бронхіт, звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна порекомендувати йому для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння?

- A. Амброксол
- B. Фалімінт
- C. Лібексин
- D. Глаувент
- E. Сальбутамол

105. Хвора 25-ти років впродовж 7-ми днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечника. Препарат із якої групи лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення?

- A. Пробіотики
- B. Спазмолітики
- C. Жовчогінні
- D. Антациди
- E. Адаптогени

106. Під час відпуску безрецептурного препарату для симптоматичного лікування риніту хворому з артеріальною гіпертензією для максимального зниження вірогідності розвитку небажаної системної судинозвужувальної дії слід рекомендувати таку лікарську форму:

- A. Мазь
- B. Гель
- C. Краплі
- D. Аерозоль
- E. Таблетки

107. Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив суматриптан. Вкажіть механізм дії даного препарату:
- A. Селективний агоніст 5-HT_1 - серотонінових рецепторів
 - B. Селективний антагоніст 5-HT_1 - серотонінових рецепторів
 - C. Неселективний α - адреноблокатор
 - D. Стимулятор β -адренорецепторів
 - E. Селективний α -адреноблокатор
108. При одночасному застосуванні гентаміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик:
- A. Нефротоксичності
 - B. Гепатотоксичності
 - C. Кардіотоксичності
 - D. Нейротоксичності
 - E. Імовірності алергічних реакцій
109. Хворому 30-ти років з діагнозом гострого остеомієліту призначили антибіотик, який добре проникає в кісткову тканину. Який засіб було обрано?
- A. Лінкоміцин
 - B. Біцилін-3
 - C. Бензилпеніцилін
 - D. Поліміксин-М
 - E. Ампіцилін
110. Хворому на артеріальну гіпертензію призначили діуретик гіпотіазид по 0,025 двічі на добу в першу половину дня. Через тиждень хворий почав відчувати біль в ділянці серця, м'язову слабкість та тремор кінцівок. Яка побічна дія препарату спостерігається?
- A. Гіпокаліємія
 - B. Артеріальна гіпотензія
 - C. Гіперкаліємія
 - D. Гіперкальціємія
 - E. Гіпомагніємія
111. Найбільший нефропротекторний вплив у хворих на цукровий діабет II типу мають:
- A. Блокатори рецепторів ангіотензину II
 - B. Антагоністикальцію
 - C. Діуретики
 - D. β -адреноблокатори
 - E. Стимулятори імідазолінових рецепторів
112. У хворого в анамнезі ІХС, стенокардія напруги. Під час фізичного навантаження з'явилися стискаючі пекучі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги?
- A. Таблетки нітрогліцерину під язик

- В. Введення анальгін у в/м
- С. Введення димедролу в/м
- Д. Введення промедолу в/м
- Е. Подача зволоженого кисню

113. У хворого діагностували астматичний статус. Який засіб показаний в першу чергу?

- А. Преднізолон
- В. Амброксол
- С. Папаверин
- Д. Мукалтин
- Е. Супрастин

114. Яка група гіпотензивних препаратів протипоказана хворим на гіпертонічну хворобу з гіперурікемією?

- А. Тіазидні діуретики
- В. α -адреноблокатори
- С. Інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту
- Д. Антагоністи кальцію
- Е. β -адреноблокатори

115. Порекомендуйте пацієнту, хворому на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст β_2 - адренорецепторів пролонгованої дії:

- А. Сальметерол
- В. Клемастин
- С. Теофілін
- Д. Кромолін-натрій
- Е. Іпратропію бромід

116. Хворому 74-х років призначено тривалий прийом фуросеміду з метою лікування хронічної серцевої недостатності. Який препарат доцільно призначити йому з метою запобігання гіпокаліємії?

- А. Аспаркам
- В. Триметазидин
- С. Ніфедипін
- Д. Корвалтаб
- Е. Веропаміл

117. Виберіть лікарський засіб, що селективно інгібує ЦОГ-2:

- А. Целекоксиб
- В. Диклофенакнатрію
- С. Ацетилсаліцилова кислота
- Д. Парацетамол
- Е. Індометацин

118. У хворого 46-ти років після часткової резекції шлунка виникли скарги на загальну слабкість, погіршення апетиту, затерпність та біль у кінцівках „відчуття ”повзання мурашок”, відчуття печіння в язиці. Діагностовано В₁₂- дефіцитну анемію. Який препарат доцільно призначити хворому?

- A. Ціанокобаламін
- B. Сорбіфер-дурулес
- C. Еритропоетин
- D. Преднізолон
- E. Вінбластин

119. До лікарні звернулася жінка з дитиною 4-х років, яка випила флакон очних капель. Через 30 хвилин після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Який із препаратів міг спричинити описані прояви?

- A. Атропін
- B. Новокаїн
- C. Мезатон
- D. Лідокаїн
- E. Адреналін

120. Хвора 36-ти років, з метою симптоматичного лікування гіпертермії на фоні застудного захворювання, протягом доби прийняла 7 таблеток парацетамолу. Який лікарський засіб слід застосувати в даному випадку як антидот?

- A. Ацетилцистеїн
- B. Бемегрид
- C. Метиловий спирт
- D. Протаміну сульфат
- E. Етилови

121. Про який найбільш частий побічний ефект необхідно інформувати пацієнтів при відпуску антацидних засобів на основі сполук алюмінію?

- A. Закреп
- B. Діарея
- C. Печія
- D. Дисбактеріоз
- E. Утруднення сечовиділення