

Проведите анализ листов врачебных назначений у больных, находящихся на стационарном лечении:

1. Перечислите основные подходы к лечению указанных заболеваний.
2. Укажите к какой фармакологической группе принадлежит каждый из приведенных препаратов, перечислите положительные и негативные фармакологические эффекты препаратов.
3. Из списка выберите наиболее рациональные препараты для лечения данного заболевания. Укажите особенности их применения.
4. Предложите показатели/критерии (клинические, лабораторные и др.) для оценки эффективности и безопасности лечения.

1. Диагноз: *Беременность 28 недель. Железodefицитная анемия (гемоглобин 84 г/л, эритроциты $3,5 \times 10^{12}/л$, цветовой показатель – 0,72).*

1. Переливание одногруппной крови
200 мл в/в капельно
2. Sol. «Reopolyglukin» – 400 ml
В/в капельно 1 раз в 2 дня
3. Dr. «Ferroplex»
По 1 драже 3 раза в день
4. Sol. Acidi ascorbinici 5% – 1 ml
По 1 мл в/м 2 раза в день
5. Tab. Acidi folici 0,5
По 1 таблетке в день
6. Sol. Cyanocobalamini 0,05% – 1 ml
По 1 мл в/м 3 раза в день
7. Sol. Coffeini natrii benzoatis 10% – 1 ml
По 1 мл в/м 2 раза в день

8. Sol. «Ferrum Lec» – 2 ml
По 2 мл в/м 1 раза в день
9. Tab. Calcii gluconatis 0,5
По 1 таблетке 2 раза в день
10. Tab. «Gyno-Tardyferon» №30
По 1 таблетке 2 раза в день

2. Диагноз: *Хронический гипоацидный гастрит типа А, тяжелое течение, период обострения. Мегалобластная анемия.*

1. Tab. «De-nol»
По 2 таблетке 2 раза в день
2. Caps. «Globiron» № 30
По 1 капсуле 1 раз в день
3. Tab. Acidin-pepsini 0,5
По 1 таблетке 3 раза в день
4. Tab. Ac. folici 0,001
По 1 таблетке 3 раза в день
5. Sol. Цианокобаламини 0,01% – 1,0 ml
По 1 мл в/м 1 раз в день
6. Caps. «Imodium» № 20
По 1 табл. После каждого эпизода жидкого стула
7. Susp. «Almagel А» – 200 ml
По 1 ст. ложке 4 раза в день до еды
8. Caps. «Creon 25000» N50
По 1 капсуле 3 раза в день
9. Sol. «Ferrum Lec» – 2 ml
По 2 мл в/м 1 раз в день
10. Sol. Drotaverini 2% – 2 ml
По 2 мл в/м 1 раз в день