

Проведите анализ листов врачебных назначений у больных, находящихся на стационарном лечении:

1. Перечислите основные подходы к лечению указанных заболеваний.
2. Укажите к какой фармакологической группе принадлежит каждый из приведенных препаратов, перечислите положительные и негативные фармакологические эффекты препаратов.
3. Из списка выберите наиболее рациональные препараты для лечения данного заболевания. Укажите особенности их применения.
4. Предложите показатели/критерии (клинические, лабораторные и др.) для оценки эффективности и безопасности лечения.

1. **Диагноз:** Хронический активный гепатит вирусного генеза (вирус гепатита С, стадия репликации вируса) с явлениями гепато-целлюлярной недостаточности.

1. Peginterferonum alfa - 2a 0,180

Содержимое 1 шприц-тюбика вводить подкожно
1 раз в неделю в течении 48 недель

2. Tab.Ribavirinum 0,2

По 1 табл. 3 раза в день в течении 1 месяца

3. Baralgin 5,0 ml

По 5 мл 1 раз в сутки в/м.

4. Tab.Prednizoloni 0,005

По 40 мг 1 раз в день в первую половину дня

5. Sol. «Ornitox»

По 20мл в/венно, капельно, разведя в
500 мл изотонического р-ра 1 раз в день

6. Sol.Glucosae 5%-400,0 ml

По 1 флакону в/вено, капельно 1 раз в день

7. Hepasol A 500 ml

По 1 флакону в/вено, капельно 1-2 раза в день.

8. Tab. Paracetamoli 0,5

По 2 таб. в день приема противовирусного препарата

9. Sol. Glutargini 4%-5 ml

По 50мл в/венно, капельно, разведя в
200 мл изотонического р-ра 1-2 раза в день

10. Caps. Essentiale forte H 0,3

По 2 табл. 3 раза в день

2. **Диагноз:** Цирроз печени кардиального генеза с явлениями гепато-целлюлярной недостаточности, портальной гипертензии, печеночной энцефалопатии. Гипертоническая болезнь, III стадия (АД 220/120 мм рт.ст.) НК IIБ стадии.

1. Tab. Amlodipini 0,01

По 10 мг 1 раз в сутки.

2. Caps. Kreon 25000

По 1 капсуле 3-4 раза в день во время или сразу после приема пищи.

3. Tab. Verospironi 0,025

По 2 табл. 3 раза в сутки.

4. Нера-Merz 3,0

По 1 пакету растворив в стакане воды
3 раза в день во время или после приема пищи

5. Нерасол А 500 ml

По 1 флакону 1-2 раза в день в/венно, капельно.

6. Нептралі 0,4

По 5 мл. в/в 1 раз в день.

7. Lasix 2,0 ml

По 2 мл в/в, разведя в 10 мл физиологического раствора 1 раз в 2-3 дня.

8. Tab. Lisinopriili 0,1

По 2 табл. 1 раз в день.

9. Caps. Essentiale forte H 0,3

По 2 табл. 3 раза в день.

10. Tab. «Panangin»

По 1 таблетке 3 раза в день.