

Проведите анализ листов врачебных назначений у больных, находящихся на стационарном лечении:

1. Перечислите основные подходы к лечению указанных заболеваний.
2. Укажите к какой фармакологической группе принадлежит каждый из приведенных препаратов, перечислите положительные и негативные фармакологические эффекты препаратов.
3. Из списка выберите наиболее рациональные препараты для лечения данного заболевания. Укажите особенности их применения.
4. Предложите показатели/критерии (клинические, лабораторные и др.) для оценки эффективности и безопасности лечения.

1. Диагноз: Эссенциальная артериальная гипертензия, II ст.
Недостаточность кровообращения IIIA ст.
Бронхиальная астма II ступень.

1. Tab. Nifedipini retard 0,02
По 1 табл. 2 раза в день
2. Tab. Enalaprili 0,01
По 1 табл. 1 раз в день
3. Caps. Salbutamoli 0,008
По 1 капс. 1 раз в день
4. Tab. Hypothiazidi 0,025
По 1 табл. 1 раз в день
5. Tab. "Aspecard"
По 1 табл. 1 раз в день
6. Tab. Propranololi 0,04
По 2 табл. 3 раз в день
7. Dr. Diazolini 0,1
По 1 драже 2 раза в день

8. Tab. Ticlopidini 0,25
По 1 табл. 2 раза в день
9. Aer. "Seretid"
По 1-2 дозы 2 раза в день
10. Tab. Torasemidi 0,005
По 1 табл. 1 раз в 3 дня

2. Диагноз: Эссенциальная артериальная гипертензия, II ст.
ИБС: атеросклеротический кардиосклероз.
Синусовая брадикардия.
Недостаточность кровообращения I ст.

1. Tab. Atorvastatini 0,02
По 1 табл. 1 раз в день
2. Caps. Verapamili 0,18
По 1 капс. 1 раз в день
3. Tab. Trimetazidini 0,02
По 1 табл. 3 раза в день
4. Tab. Metoprololi 0,05
По 1 табл. 2 раза в день
5. Tab. Amlodipini 0,005
По 1 табл. 2 раза в день
6. Tab. Atenololi 0,05
По 1 табл. 2 раза в день
7. Tab. Digoxini 0,00025
По 1 табл. 1 раз в день, 5 дней в неделю
8. Tab. "Aspecard" 0,1
По 1 табл. 1 раза в день
9. Tab. Indapamidi 0,0015
По 1 табл. 1 раз в день
10. Sol. Drotaverini 2,0 ml
По 2 мл в/м 1 раз в день