

Проведите анализ листов врачебных назначений у больных, находящихся на стационарном лечении:

1. Перечислите основные подходы к лечению указанных заболеваний.
2. Укажите к какой фармакологической группе принадлежит каждый из приведенных препаратов, перечислите положительные и негативные фармакологические эффекты препаратов.
3. Из списка выберите наиболее рациональные препараты для лечения данного заболевания. Укажите особенности их применения.
4. Предложите показатели/критерии (клинические, лабораторные и др.) для оценки эффективности и безопасности лечения.

1. Диагноз: *Острый гломерулонефрит, нефротический синдром.*

1. Tab. «Amoksiklav 2X» 1,0
По 1 табл. 2 раза в день
2. Sol. Gentamycini 4% – 2,0 ml
По 2 мл в/м 2 раза в день
3. Tab. Verospironi 0,025
По 1 табл. 2 раза в день
4. Sol. Clexani 4000 ME – 0,4 ml
По 0,4 мл п/к 1 раз в день в жировую клетчатку живота
5. Tab. Prednisoloni 0,005
По 4 табл. 2 раза в день
6. Tab. Indometacini 0,025
По 1 табл. 4 раза в день
7. Tab. Dipyridamoli 0,025
По 2 табл. 3 раза в день

8. Sol. Heparini 25000 ME – 5,0 ml
По 1 мл п/к 6 раз в день
9. Dr. Nitroxolini 0,1
По 1 драже 4 раза в день
10. Tab. Enalaprili 0,01
По 1 табл. 1 раз в день

2. Диагноз: ХБП II стадия: хронический левосторонний рецидивирующий пиелонефрит, фаза обострения, артериальная гипертензия (АД 150/100 мм рт. ст.). Алкогольный цирроз печени, фаза ремиссии.

1. Caps. Doxycyclini 0,1
По 1 капс. 2 раза в день
2. Tab. Furadonini 0,05
По 2 табл. 4 раза в день
3. Tab. Co-trimoxazoli 0,48
По 1 табл. 2 раза в день
4. Tab. Enalaprili 0,01
По 1 табл. 2 раза в день
5. Tab. «Augmentin» 1,0
По 1 табл. 2 раза в день
6. Tab. Nitroxolini 0,05
По 2 табл. 4 раза в день
7. Tab. Ciprofloxacini 0,5
По 1 табл. 2 раза в день
8. Tab. Panadoli 0,5
По 1 табл. 3 раза в день
9. Tab. Lisinoprili 0,01
По 1 табл. 2 раза в день
10. Gutt. «Canephron® N» 100 ml
По 50 капель 3 раза в день