

Проведите анализ листов врачебных назначений у больных, находящихся на стационарном лечении:

1. Перечислите основные подходы к лечению указанных заболеваний.
2. Укажите к какой фармакологической группе принадлежит каждый из приведенных препаратов, перечислите положительные и негативные фармакологические эффекты препаратов.
3. Из списка выберите наиболее рациональные препараты для лечения данного заболевания. Укажите особенности их применения.
4. Предложите показатели/критерии (клинические, лабораторные и др.) для оценки эффективности и безопасности лечения.

1. Диагноз: Инсулинзависимый сахарный диабет средней степени тяжести, период компенсации. Гипертоническая болезнь II стадия (АД 190/100 мм рт.ст.). Хронический обструктивный бронхит в фазе ремиссии.

1. Tab. Bromhexini 0,008
D.S. По 1 табл. 3 раза в день
2. Tab. Amoxicillini 0,5
D.S. По 1 табл. 3 раза в день
3. Tab. Hypothiazidi 0,025
D.S. По 1 табл. 1 раз в день утром натощак
4. Tab. Lisinoprili 0,01
D.S. По 1 табл. 1 раз в день
5. Tab. Theophilini 0,2
D.S. По 1 табл. 2 раза в день
6. Tab. Propranololi 0,04
D.S. По 1/2 табл. 2 раза в день
7. Aer. «Flixotide»
По 2 дозы 2 раза в сутки
8. Tab. Prednisoloni 0,005
D.S. По 1 табл. 3 раза в день
9. Insulini pro injectionibus 5 ml (40 ED)
D.S. По 10 ЕД 3 раза в день за 20 мин до еды
10. Tab. Glibenclamidi 0,005 № 20
D.S. По 1 табл. 2 раза в день после еды

2. Диагноз: Инсулиннезависимый сахарный диабет средней степени тяжести, период компенсации. Диабетическая полинейропатия. Гипертоническая болезнь I стадии (АД 160/80 мм рт.ст.).

1. Tab. "Tenorik"
D.S. По 1 табл. 2 раза в день
2. Tab. "Papazolium"
D.S. По 1 табл. 3 раза в день
3. Tab. "Espa-lipon 200"
D.S. По 1 табл. 3 раза в день
4. Tab. Hypothiazidi 0,025
D.S. По 1 табл. 1 раз в 3 дня
5. Tab. "Berlition 300 ЕД"
D.S. По 1 табл. 3 раза в день
6. Sol. Furosemidi 1% - 2 ml
D.S. По 2 мл 2 раза в день в/м
7. Tab. Lozartani 0,01
D.S. По 1 табл. 1 раз в день
8. Insulini pro injectionibus 5 ml (40 ED)
D.S. По 10 ЕД 3 раза в день за 20 мин до еды
9. Tab. Glimepiridi 0,001 № 30
D.S. По 1 табл. 1 раз в день перед завтраком
10. Sol. Acidi nicotinicici 1% - 1 ml
D.S. По 1 мл 2 раза в день в/м

3. Диагноз: Гипотиреоз. ИБС: Стабильная стенокардия напряжения, III ФК. Экстрасистолическая аритмия. ХСН 0 ст.

1. Tab. Levotiroxini 0,0001
D.S. По 1 табл. 1 раз в день
2. Tab. Verapamili 0,04
D.S. По 1 табл. 3 раза в день
3. Tab. Lipostabili №30
D.S. По 1 капс. 3 раза в день
4. Tab. Nitrosorbidi 0,01
D.S. По 2 табл. 4 раза в день

5. Tab. Propranololi 0,04
D.S. По 1/2 табл. 4 раза в день
6. Tab. "Aspecard" 0,01
D.S. По 1 табл. 1 раза в день
7. Tab. Cordaroni 0,2
D.S. По 1 табл. 1 раз в день
8. Tab. "Multitabs"
D.S. По 1 табл. 1 раз в день после еды
9. Sol. Corvaloli 25 ml
D.S. По 30 кап 3 раза в день
10. Tab. Indomethacini 0,025
D.S. По 1 табл. 3 раза в день

4. Диагноз: Диффузный токсический зоб. Симптоматическая артериальная гипертензия.

1. Tab. Enalapriili 0,01
D.S. По 1 табл. 1 раз в день
2. Tab. Iodomarini
D.S. По 1 табл. 2 раза в день
3. Tab. Mercasolili 0,005 № 100
D.S. По 1 табл. 4 раза в сутки
4. Tab. Hypothiazidi 0,025
По 1 табл. 1 раз в 3 дня
5. Tab. "Cardiket retard"
По 1 табл. 2 раза в день
6. Tab. Propranololi 0,04
D.S. По 1/2 табл. 2 раза в день
7. Tab. Captopriili 0,1
D.S. По 2 табл. 3 раза в день
8. Tab. Bisoprololi 0,01
D.S. По 1 табл. 1 раз в сутки
9. Sol. Acidi nicotiniici 1% - 1 ml
D.S. По 1 мл 2 раза в день в/м
10. Tab. Digoxini 0,0025
D.S. По 1 табл. 2 раза в день