

КРОК 2 КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА

1

Хвора, 25 років, вагітність 12 тижнів, поступила на стаціонарне лікування з діагнозом "негоспітальна пневмонія". Який з наведених антибактеріальних засобів доцільно призначити цій хворій?

- A** *Амоксицилін
- B** Кларитроміцин
- C** Моксифлоксацин
- D** Амікацин
- E** Доксациклін

2

До аптеки звернулася дівчина зі скаргою на печію. Наявність якого "загрозливого" симптому має спонукати аптечного працівника спрямувати хвору на консультацію до лікаря?

- A** *Чорний дьогтеподібний стілець
- B** Відрижка повітрям
- C** Відрижка кислим
- D** Кашель
- E** Помірний метеоризм

3

До аптеки звернулася дівчина зі скаргою на печію. Який препарат безрецептурного відпуску може порекомендувати фармацевт?

- A** *Алюмінію гідроксид + магнію гідроксид
- B** Омепразол
- C** Атропіну сульфат
- D** Домперидон
- E** Парацетамол

4

До аптеки звернувся чоловік зі скаргою на діарею. Який супутній симптом є "загрозливим", що вимагає консультації лікаря?

- A** *Кров у калових масах
- B** Відрижка повітрям
- C** Підвищене слиновиділення
- D** Кашель
- E** Риніт

5

До аптеки звернувся чоловік із симптомами застуди, основний із яких – біль у горлі при ковтанні. Яку із супутніх скарг можна вважати "загрозливим" симптомом?

- A** *Зміна (потемніння) кольору сечі
- B** Підвищення температури тіла до 38°C

C Ринорея

D Сухий помірний кашель

E Незначна загальна слабкість

6

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря-педіатра, щодо вибору лікарського препарату для лікування болю голови у 11-річної дитини.

A *Ацетамінофен

B Ацетилсаліцилова кислота

C Метамізол натрію

D Суматриптан

E Індометацин

7

До аптеки звернувся чоловік похилого віку зі скаргами на закреп. Яку із супутніх скарг можна вважати "загрозливим" симптомом?

A *Підвищення температури тіла

B Метеоризм

C Нерізкий біль у животі

D Відчуття важкості у шлунку

E Відрижка

8

У хворої М., 25 років, вагітність 14 тижнів, виявлено АТ 160/110 мм рт.ст., ЧСС - 78/хв. Якому з наведених антигіпертензивних засобів доцільно надати перевагу?

A *Метилдопа

B Еналаприл

C Метопролол

D Лозартан

E Доксазозин

9

У хворої М., 24 років, вагітність 14 тижнів, виявлено ознаки ГРВІ. Температура тіла 38,5°C. Який з наведених анальгетиків-антипіретиків доцільно призначити цій хворій?

A *Парацетамол

B Німесулід

C Метамізол натрію

D Мефенамова кислота

E Кеторолак

10

Хворий звернувся до фармацевта зі скаргою на біль в колінних суглобах. Який додатковий симптом має спонукати працівника аптеки спрямувати хворого на консультацію до лікаря?

A *Ранкова скутість

B Печія

C Риніт

D Сухий кашель
E Відрижка

11

Вкажіть лікарський препарат для усунення болю голови, який можна порекомендувати пацієнту, що приймає нітрогліцерин для усунення нападів стенокардії:

- A* *Валідол
- B* Метамізол натрію
- C* Кеторолак
- D* Ацетамінофен
- E* Суматриптан

12

До аптеки звернулась жінка зі скаргами на нежить, біль голови та підвищення температури тіла до 37,2°C, які тривають близько двох тижнів. Які будуть ваші рекомендації?

- A* *Необхідна консультація лікаря
- B* Фенілефрин у краплях
- C* Розчин морської солі у краплях
- D* Промивання носа розчином кухонної солі
- E* Оксиметазолін у спреї

13

Пацієнту з ішемічною хвороби серця для корекції гіперхолестеринемії призначено аторвастатин. Вживання яких харчових продуктів необхідно виключити у зв'язку з небезпекою виникнення побічної дії препарату?

- A* *Грейпфрутовий сік
- B* Молоко
- C* Червона риба
- D* Картопля
- E* Томатний сік

14

До провізора в аптеку звернулась жінка на 27 тижні вагітності з проханням порекомендувати засіб від закріпів. Застосування якого із проносних засобів можливе у даному випадку?

- A* *Лактулоза
- B* Листя сени
- C* Рицинова олія
- D* Макрогол
- E* Натрію пікосульфат

15

Яку рекомендацію щодо раціонального застосування панкреатину необхідно надати відвідувачу аптеки, який застосовує цей препарат симптоматично з приводу диспепсії після надмірного вживання жирної їжі?

- A* *Приймати під час вживання їжі

- B** Приймати за 30 хвилин до прийому їжі
- C** Запивати молоком
- D** Вживати через 1 годину після прийому їжі
- E** Препарат розжовувати

16

До аптеки звернувся батько 5-річної дитини, у якої напередодні після переохолодження температура тіла підвищилась до 38°C та з'явився нежить. Який препарат Ви можете порекомендувати для симптоматичного лікування лихоманки у даному випадку?

- A** *Ацетамінофен
- B** Ацетилсаліцилова кислота
- C** Диклофенак натрію
- D** Індометацин
- E** Целекоксиб

17

У хворого Н, 45 років, якому для зняття запалення та болю у колінних суглобах лікар призначив лікарський засіб із групи нестероїдних протизапальних препаратів, з'явився біль в епігастральній ділянці та печія. Вкажіть лікарський препарат, який міг спричинити це явище?

- A** *Диклофенак натрію
- B** Парацетамол
- C** Лоратадин
- D** Преднізолон
- E** Кальцію хлорид

18

Яку рекомендацію слід надати хворому, який звернувся в аптеку з приводу появи болю у суглобах великого калібру після значного переохолодження (в анамнезі у дитинстві діагностовано ревматичну лихоманку)?

- A** *Обов'язково звернутися до лікаря-спеціаліста
- B** Призначити НПЗП у вигляді таблеток
- C** Призначити НПЗП у топічній формі
- D** Рекомендувати антибіотик
- E** Запропонувати знеболюючий засіб

19

Пацієнту З., 43 років, у якого діагностовано ревматоїдний артрит, призначено декілька протизапальних препаратів. При черговому лабораторному обстеженні виявлено підвищення рівня глюкози та кількості лейкоцитів. Вкажіть який із перелічених лікарських засобів спричинив наведені зміни?

- A** *Триамцинолон
- B** Диклофенак натрію
- C** Парацетамол
- D** Сульфасалазин
- E** Метотрексат

20

До аптеки звернулася жінка з рецептом на препарат заліза у формі драже, призначений їй лікарем для лікування залізодефіцитної анемії. У межах фармацевтичної опіки оберіть вірну рекомендацію щодо умов належного застосування залізовмісних препаратів.

- A** *Не можна розжовувати драже
- B** Потрібно розжовувати драже
- C** Запивати чаєм
- D** Запивати молоком
- E** Приймати перед сном

21

У хворого М., 65 років, який переніс інфаркт міокарда, на тлі тривалого застосування клопідогрелю виникли відчуття важкості та болю в епігастрії. У межах фармацевтичної опіки, скерованої на лікаря, вкажіть лікарський засіб який доцільно призначити для гастропротекції у даному випадку?

- A** *Пантопрозол
- B** Вісмуту субцитрат
- C** Атропіну сульфат
- D** Сукральфат
- E** Гастроцепін

22

Вкажіть умови раціонального застосування лікарських препаратів для симптоматичного лікування болю у горлі у формі льодяників і пігулок для розсмоктування:

- A** *Тримати у роті до повного розсмоктування
- B** Запивати водою
- C** Застосовувати перед їдою
- D** Препарати розжовувати
- E** Запивати молоком

23

Вкажіть, застосування якого з наведених безрецептурних препаратів можливе для симптоматичного лікування риніту у вагітних?

- A** *Розчин морської солі
- B** Беклометазон
- C** Оксиметазолін
- D** Нафазолін
- E** Ксилометазолін

24

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря, та вкажіть антигістамінний препарат для симптоматичного лікування алергічного риніту, при прийомі якого не виникає сонливість:

- A** *Лоратадин
- B** Хлоропірамін (супрастин)

C Дифенгідрамін (дімедрол)

D Клемастин (тавегіл)

E Мебгідролін (діазолін)

25

У межах фармацевтичної опіки проконсультуйте хворого про припустиму тривалість місцевого застосування препаратів судинозвужувальної дії для симптоматичного лікування риніту:

A *Не більше 5-7 днів

B Протягом місяця

C 14 днів

D 2 місяці

E 10 днів

26

Вкажіть препарат вибору для місцевого лікування герпесу губ:

A *Ацикловір

B Кетоконазол

C Пімафуцин

D Ектерицид

E Мірамистин

27

Вкажіть, який з препаратів найдоцільніше застосовувати для місцевого лікування термічних опіків:

A *Декспантенол

B Саліцилову кислоту

C Папаверину гідрохлорид

D Резорцин

E Азелаїнову кислоту

28

До аптеки звернулась жінка зі скаргами на сухість у роті та глотці, які виникли на тлі застосування препарату для лікування сухого кашлю. Вкажіть, прийом якого з наведених протикашльових лікарських засобів міг спричинити появу таких симптомів:

A *Преноксдіазин (лібексин)

B Кодеїну фосфат + терпінгідрат + натрію гідрокарбонат (кодтерпін ІС)

C Декстрометорфану гідробромід + кислота аскорбінова (атусин)

D Глауцину гідробромід + ефедрину гідрохлорид (бронхолітин)

E Бутамірату цитрат (синекод)

29

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря, щодо препарату вибору з групи анальгетиків-антипіретиків, який рекомендовано застосовувати для усунення лихоманки

при ГРВІ у період вагітності:

A *Ацетамінофен

B Диклофенак натрію

C Метамізол натрію

D Целекоксиб

E Індометацин

30

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на відвідувача аптеки зі скаргами на підвищену температуру тіла, нежить, біль голови, щодо максимально допустимих разової

та добової доз парацетамолу:

A *1000 мг та 4000 мг

B 500 мг та 3000 мг

C 750 мг та 3500 мг

D 500 мг та 2000 мг

E 1000 мг та 2500 мг

31

Вкажіть вірну рекомендацію, що сприяє підвищенню ефективності лікарської терапії із застосуванням відхаркувальних лікарських засобів при симптоматичному лікуванні вологого кашлю:

A *Вживати достатню кількість води

B Вживати лужні мінеральні води

C Вживати кислі рідини

D Вживати молоко

E Вживати сік грейпфруту

32

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря, щодо найбільш характерної симптоматики, що виникає при тривалому застосуванні бромідів (бромізму):

A *Риніт, кон'юнктивіт, діарея

B Кашель

C Підвищена збудливість

D Зниження маси тіла

E Ламкість волосся, нігтів

33

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря, про недоцільність одночасного призначення кеторолаку та препаратів гінкго дволопатевого. Поясніть, що одночасний прийом цих препаратів підвищує ризик:

A *Кровотеч

B Болю голови

C Закрепу

D Запаморочення

E Фотофобії

34

У хворого, що перебуває у ревматологічному відділенні лікарні, виникла шлунково-кишкова кровотеча на 6-ий день лікування кеторолаком у формі

ін'єкційного розчину. Проінформуйте лікаря, що допустима тривалість курсу лікування кеторолаком у даній лікарській формі не повинна перевищувати:

- A.** *2 дні
- B.** 5 днів
- C.** 7 дні
- D.** 10 днів
- E.** 14 днів

35

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря-кардіолога, щодо обмежень із застосування ацетилсаліцилової кислоти. Вкажіть супутнє захворювання при якому цей препарат необхідно призначати з обережністю:

- A** *Бронхіальна астма
- B** Гайморит
- C** Дискінезія жовчовивідних шляхів
- D** Гломерулонефрит
- E** Цукровий діабет

36

Порекомендуйте лікарю групу антимікробних засобів, яка є найбільш безпечною для застосування у жінок в період лактації:

- A** *Пеніциліни
- B** Амфеніколи
- C** Фторхінолони
- D** Поліміксини
- E** Тетрацикліни

37

Проінформуйте лікаря приймального відділення, чим небезпечний одночасний прийом ацетилсаліцилової кислоти та алкоголю:

- A** *Посиленням гастротоксичності
- B** Ураженням зорового нерву
- C** Ураженням наднирників
- D** Ураженням легень
- E** Аритмією

38

Вкажіть, який з нижче наведених симптомів не становить загрози для хворого при кон'юнктивіті:

- A** *Посилення гостроти зору
- B** Фотофобія
- C** Рясні слизисто-гнійні виділення з очей
- D** Болючість при пальпації закритих очей
- E** Підвищення температури тіла вище 38°C

39

До аптеки звернувся хворий зі скаргами на відсутність ефективності препарату кетотифен, який він приймає з приводу алергічного дерматиту протягом одного

місяця. Вкажіть тривалість курсу лікування стабілізаторами мембран опасистих клітин, після якого розвивається клінічно

значущий ефект:

A *2-3 місяці

B 7 днів

C 2 тижні

D 4 тижні

E 6 тижнів

40

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на відвідувача аптеки з ГРВІ, щодо раціонального застосування анальгетиків-антипіретиків. Вкажіть, при якій температурі тіла доцільно починати прийом жарознижувальних препаратів?

A *Вищій за 38,5°C

B 36,9°C

C 37,3°C

D 38,0°C

E 37,7°C

41

Вкажіть “загрозливий” симптом, який дозволяє запідозрити у хворого серйозне захворювання, що вимагає обов'язкового втручання лікаря, при гострій діарейі:

A *Виділення малої кількості сечі

B Печія

C Відсутність апетиту

D Зздуття живота

E Тривалість діарейі понад 3 години

42

Вкажіть, з яким препаратами не можна поєднувати відхаркувальні засоби?

A *Протикашльовими

B Антибактеріальними

C Муколітиками

D Полівітамінами

E Деконгестантами

43

Вкажіть, який препарат слід застосовувати при неефективності жарознижуючої дії парацетамолу у дітей?

A *Ібупрофен

B Ацетилсаліцилова кислота

C Німесулід

D Напроксен

E Диклофенак натрію

44

Жінка 24 років скаржиться на біль голови, який виник після стресової ситуації. Який з перелічених є препаратом вибору для симптоматичного лікування?

- A** *Парацетамол
- B** Метамізол натрію
- C** Напроксен
- D** Кислота ацетилсаліцилова
- E** Ібупрофен

45

Вагітна жінка, 30 років, скаржиться на гострий біль в спині. Ваші рекомендації?

- A** *Негайно звернутися до лікаря
- B** Місцево нестероїдний протизапальний препарат
- C** Місцево анальгетик
- D** Нестероїдний протизапальний препарат перорально
- E** Анальгетик перорально

46

Вкажіть “загрозливий” симптом, який дозволяє запідозрити у хворого серйозне захворювання, що вимагає обов'язкового втручання лікаря, при гострій діарейі:

- A** *Стілець у вигляді “рисового відвару”
- B** Наявність неперетравленої їжі в калових масах
- C** Рідкий кал
- D** Здуття живота
- E** Діарея, що супроводжується печією

47

Вкажіть, який з наведених засобів є препаратом вибору при м'язовому болю у дітей?

- A** *парацетамол
- B** німесулід
- C** ацетилсаліцилова кислота
- D** диклофенак натрію
- E** індометацин

48

У хворої 36 років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати у даному випадку?

- A** *Рокситроміцин
- B** Ампіцилін
- C** Пеніцилін
- D** Цефуроксим
- E** Ванкоміцин

49

Вкажіть супутню патологію, при якій симпатоміметики для лікування риніту призначають з обережністю:

- A** *Артеріальна гіпертензія
- B** Пронос
- C** Гастрит

D Гіпотонія
E Мікседема

50

Відвідувач аптеки просить відпустити препарат для лікування вологого кашлю (в анамнезі – виразка шлунка). Вкажіть, який препарат є оптимальним для такого хворого?

- A* *корінь алтеї
- B* трава термопсису
- C* ацетилцистеїн
- D* карбоцистеїн
- E* бромгексин

51

Який з анальгетиків-антипіретиків рекомендовано ВООЗ для застосування у дитячій практиці:

- A* *ацетамінофен
- B* німесулід
- C* диклофенак натрію
- D* метамізол натрію
- E* ацетилсаліцилова кислота

52

Хворому призначене лікування з приводу негоспітальної пневмонії. Проконсультуйте лікаря, який з призначених лікарських засобів може викликати подовження часу згортання крові?

- A* *ацетилсаліцилова кислота
- B* лактулоза
- C* амброксол
- D* корінь алтея
- E* амоксицилін

53

Вкажіть, препарати з якої фармакологічної групи не використовуються для симптоматичного лікування болю в горлі?

- A* *системні антибіотики
- B* антисептики
- C* НПЗП
- D* засоби на основі ефірних масел
- E* місцеві анестетики

54

Дайте рекомендації відвідувачу аптеки зі скаргами на посилення кашлю і виділення більшої кількості мокротиння після прийому відхаркувального препарату, рекомендованого провізором 3 дні тому:

- A* *дані явища свідчать про ефективність препарату
- B* необхідна консультація лікаря
- C* необхідно відмінити відхаркувальний препарат

D необхідно провести фармакотерапевтичну заміну

E необхідно додати антигістамінний препарат

55

Вкажіть, застосування якого послаблюючого препарату припустиме у період вагітності:

A *лактолоза

B листя сени

C сироп жостера

D магнію сульфат

E олія рицинова

56

Поясніть, у чому полягають правила раціонального застосування ентеросорбентів з іншими препаратами?

A *прийом препаратів слід розділити не менш ніж 2-х годинним інтервалом

B приймаються одночасно з іншими препаратами

C ентеросорбенти приймають до їжі, а інші препарати після їжі

D ентеросорбенти приймати після їжі, а інші препарати до їжі

E при призначенні ентеросорбентів прийом інших препаратів припиняється

57

В аптеку звернувся пацієнт зі скаргами на біль у попереку, підвищення температури, які виникли у нього після переохолодження. Протягом 4 днів застосовував мазь з диклофенаком натрію, проте стан не поліпшився. Що можна порекомендувати у даному випадку?

A. *Терміново звернутися до лікаря

B. Препарати місцевопоздразнювальної дії

C. Сполучення диклофенака натрію в пероральній та трансдермальній формі

D. Диклофенак натрію перорально

E. Фізіотерапевтичне лікування

58

Укажіть, через який час розвивається клінічно значущий ефект при застосуванні хондропротекторних препаратів:

A. *4-6 тижнів постійного прийому

B. 30 хв. – 1 год.

C. 5-6 днів постійного прийому

D. 2-4 місяці постійного прийому

E. 5-6 місяців постійного прийому

59

Вкажіть найбільш оптимальну кратність застосування мазі, до складу якої входить ацикловір:

A *кожні 4-5 годин

B одноразово

C щогодини

D 2 рази на добу

E не регламентується

60

Які рекомендації необхідно дати хворому при посиленні висипань і сухості шкіри після тижневого використання противугрового препарату?

- A.* *Продовжувати лікування, оскільки це період “явного погіршення”
- B.* негайно звернутися до лікаря
- C.* Збільшити кратність використання препарату
- D.* Зменшити кратність використання препарату
- E.* негайно відмінити препарат

61

Укажіть, які рекомендації необхідно дати хворому зі скаргами на пекучий біль та міхурцеві висипання біля очей:

- A.* *Звернутися до лікаря-дерматолога
- B.* Розкрити міхурці та обробити антисептиком
- C.* Нанести мазь ацикловіру
- D.* Протирати уражені ділянки розчином антисептика
- E.* Обробити уражену ділянку топічним антибіотиком

62

До аптеки звернулася молода жінка з проханням поради профілактичний засіб від нападів мігрені, який пов'язаний з менструальним циклом. Який з ОТС-препаратів їй можна рекомендувати?

- A.* *Парацетамол
- B.* Женьшень
- C.* Ехінацея
- D.* Полівітаміни
- E.* Препарати магнію

63

До аптеки звернувся літній чоловік, який тривалий час приймав ацетилсаліцилову кислоту, яка була призначена лікарем з приводу ІХС. Останнім часом з'явилися печія і біль у епігастрії. Чим обумовлені дані скарги?

- A* *проявом НПЗП-гастропатії
- B* індивідуальною непереносимістю препарату
- C* віковими особливостями
- D* проявом основного захворювання
- E* можливим перевищенням дози препарату

64

Пацієнт прийняв таблетку пакселадину з метою зменшення сухого надсадного кашлю. За обідом він випив склянку вина. Через годину у нього виникли слабкість, запаморочення, сонливість. Як можна розцінити дану ситуацію?

- A* *прояв небажаного варіанту взаємодії пакселадину із алкоголем
- B* отруєння етиловим спиртом
- C* симптоми передозування пакселадину
- D* побічні реакції на пакселадин

E симптоми алергії на ароматичні речовини вина

65

Проконсультуйте лікаря, які заходи профілактики “НПЗП-гастропатій” необхідно застосувати при призначенні НПЗП?

A *інгібітор протонної помпи на ніч

B застосовувати НПЗП в свічках

C застосовувати НПЗП в ін’єкційних формах

D застосовувати НПЗП після прийому їжі

E застосовувати НПЗП за 30 хв до прийому їжі

66

Проконсультуйте лікаря, який лікарський засіб доцільно застосувати для підготовки пацієнта до проведення колоноскопії?

A. *Макрогол

B. Рицинова олія

C. Натрію пікосульфат

D. Сенна (листя)

E. Бісакодил

67

Дитина 16 років з приводу позалікарняної пневмонії отримує цефотаксим. Через два дні лікування стілець рідкий до 4-х разів на добу. Проконсультуйте лікаря, який лікарський засіб доцільно додати до схеми терапії для усунення діареї:

A *препарати біфідо- та лактобактерій

B панкреатин

C розчини для регідратації

D діосмектит

E лоперамід

68

У хлопчика 12 років на обличчі та плечах з’явилась вугрова висипка у вигляді чорних крапок. При використанні бензоїл пероксиду через тиждень висипка посилилась. Надайте рекомендації щодо подальшого лікування:

A * продовжити прийом бензоїл пероксиду

B відмінити бензоїл пероксид

C призначити інший кератолітик

D змінити режим застосування бензоїл пероксиду

E зробити перерву у застосуванні бензоїл пероксиду

69

Про яку побічну дію, характерну для протикашльових засобів центральної дії, необхідно повідомити пацієнта в межах фармацевтичної опіки?

A. *Зниження реакції при керуванні транспортом

B. Зниження апетиту

C. Зниження лібідо

D. Зниження артеріального тиску

E. Підвищення апетиту

70

Хвора звернулася до фармацевта зі скаргою на біль в колінних суглобах. Який додатковий симптом має спонукати працівника аптеки спрямувати хворого на консультацію до лікаря?

A *Біль у суглобах, що з'явився через 2 тижні після ангіни

B Біль у суглобах, що супроводжується печією

C Біль у суглобах, що супроводжується рясними прозорими виділеннями з носа

D Біль у суглобах, що супроводжується сухим помірним кашлем

E Біль у суглобах, що супроводжується відрижкою

71

До аптеки звернулася жінка зі скаргою на закреп. Який препарат безрецептурного відпуску найдоцільніше порекомендувати для симптоматичного лікування?

A *Листя сени

B Хлорамфенікол

C Будесонід

D Тинідазол

E Сандостатин

72

В аптеку звернулася жінка зі скаргою на вздуття живота. Який препарат безрецептурного відпуску найдоцільніше порекомендувати для симптоматичного лікування?

A. *Симетикон

B. Хлорамфенікол

C. Будесонід

D. Орнідазол

E. Пантопразол

73

В аптеку звернувся чоловік зі скаргою на вздуття живота. Яку із супутніх скарг можна вважати загрозливою і такою що вимагає консультації лікаря?

A *Наявність жовтяниці

B Наявність відрижки повітрям

C Наявність підвищеного слиновиділення

D Наявність відрижки гірким

E Наявність печії

74

Хвора, 26 років, вагітність 16 тижнів, поступила на стаціонарне лікування з діагнозом "гострий пієлонефрит". Проконсультуйте лікаря, який з наведених антибактеріальних засобів доцільно призначити цій хворій?

A *Амоксицилін

B Доксациклін

C Амікацин

D Ципрофлоксацин
E Ко-тримоксазол

75

До аптеки звернувся юнак із симптомами вугрової хвороби. Яку із супутніх скарг чоловіка можна вважати загрозливою і такою, що вимагає консультації лікаря?

- A* *поява вугрів супроводжується підвищенням температури тіла
- B* ураження вугревою висипкою невеликих ділянок шкіри
- C* вугрі невеликі за діаметром та неболісні
- D* вугрова висипка не залишає рубців
- E* поява вугрів не супроводжується підвищенням температури тіла

76

Для профілактики йодної недостатності за призначенням лікаря жінка, 35 років, приймала калію йодид. За 1,5 місяці значно почастишало серцебиття, з'явився тремор, підвищилась дратівливість, посилилось потовиділення. Які рекомендації необхідно надати жінці?

- A* * Припинити прийом препарату та звернутись до лікаря
- B* Призначити тіамазол
- C* Призначити заспокійливі засоби
- D* Призначити антиаритмічні засоби
- E* Збільшити дозу калію йодиду

77

До аптеки звернулась жінка зі скаргами на сухий кашель, який триває протягом місяця. Які будуть ваші рекомендації?

- A* *Необхідна консультація лікаря
- B* Прийом амброксолу у сиропі
- C* Прийом ацетилцистеїну у порошку
- D* Прийом преноксдіазину у таблетках
- E* Прийом гвайфенезину

78

До аптеки звернувся молодий чоловік із симптомами застуди та кашлем. Яку із супутніх скарг чоловіка можна вважати загрозливою і такою що вимагає консультації лікаря?

- A* *Кашель, що супроводжується нападами ядухи
- B* Кашель, що супроводжується субфебрильною температурою упродовж 2-х діб
- C* Турбує помірна загальна слабкість
- D* Турбує підвищена пітливість упродовж 2-х діб
- E* Турбує відчуття закладеності носа

79

До аптеки звернувся чоловік, 53 років, зі скаргами на відчуття переповнення шлунка після їжі, здуття живота, закреп. Який з безрецептурних лікарських засобів можна порекомендувати в даному випадку?

- A* *Домперидон

- B*** Лактулоза
- C*** Фамотидин
- D*** Силімарин
- E*** Симетикон

80

До аптеки звернувся чоловік похилого віку зі скаргами на закреп. Регулярно приймав сенадексин, але послаблюючий ефект наразі відсутній. Який з безрецептурних лікарських засобів можна порекомендувати в даному випадку?

- A*** *Лактулоза
- B*** Рицинову олію
- C*** Макрогол
- D*** Симетикон
- E*** Домперидон

81

Пацієнтці для корекції дисбіозу призначений препарат, що містить лактобактерії. Які рекомендації необхідно надати щодо прийому цього препарату?

- A*** *Запивати молоком
- B*** Застосовувати після вживання їжі
- C*** Попередньо розчинити в гарячій воді
- D*** Приймати одночасно з сорбентами
- E*** Запивати апельсиновим соком

82

У хворого 45 років після курсу антибіотикотерапії з'явилися скарги на здуття живота, діарею, біль в животі. Проконсультуйте лікаря, який препарат слід додатково призначити хворому?

- A.*** *Біфідо- та лактобактерії
- B.*** Активоване вугілля
- C.*** Симетикон
- D.*** Панкреатин
- E.*** Дротаверину гідрохлорид

83

Вкажіть, який послаблюючий препарат не слід рекомендувати хворому на спастичні закрепи?

- A*** *Листя сени
- B*** Пікосульфат натрію
- C*** Лактулоза
- D*** макрогол
- E*** Рицинова олія

84

Хворий, 53 років, звернувся до провізора зі скаргами на раптовий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку після емоційного навантаження. Який препарат рекомендовано для епізодичного застосування для усунення больового

нападу?

A *Нітрогліцерин

B Ізосорбїду 5-мононїтрат

C Дїазепам

D Бісопролол

E Дилтіазем

85

У хворого, 47 років, який тривалий час знаходиться на лікуванні у фтизіатричному відділенні, різко погіршився слух. Проконсультуйте лікаря, який з перерахованих препаратів міг спричинити це явище?

A *Стрептоміцин

B Ізонїазид

C Етамбутол

D Рифампіцин

E Етіонамід

86

До провізора звернулась вагітна жінка зі скаргами на гостру діарею, яка супроводжується підвищенням температури, та попросила порекомендувати препарат для лікування. Яка повинна бути тактика провізора в даному випадку?

A *Порекомендувати негайно звернутися до лікаря.

B Порекомендувати лоперамід.

C Порекомендувати активоване вугілля

D Порекомендувати мебеверин.

E Порекомендувати ентеросгель.

87

Вкажіть "загрозливі" симптоми, які вимагають обов'язкового звернення до лікаря, за наявності кашлю:

A *Сухий кашель понад 2 тижні

B Сухий кашель 2-3 дні

C Слабкість протягом кількох днів

D Біль у горлі

E Втрата апетиту

88

Вкажіть, який із перелічених лікарських засобів рекомендується використовувати для симптоматичного лікування діареї неінфекційного генезу у дорослих?

A *Лоперамід

B Пантопразол

C Ондансетрон

D Панкреатин

E Метоклопрамід

89

Проконсультуйте лікаря-педіатра щодо вибору лікарського засобу, який доцільно застосовувати для лікування кандидозу ротової порожнини у дитини 7-и місяців:

- A* *водний розчин метиленового синього
- B* спиртовий розчин борної кислоти
- C* спиртовий розчин метиленового синього
- D* 0,1% розчин гексетидину (стоматидин)
- E* водний розчин калію перманганату

90

Вкажіть, який із наведених лікарських засобів показаний для лікування діареї у дитини віком 5 місяців:

- A* *діосмектит (смекта)
- B* лоперамід
- C* бісакодил
- D* симетикон (еспумізан)
- E* декспантенол

91

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря, щодо шляху введення інсуліну у складі “поляризуючої суміші” (глюкоза, калію хлорид, інсулін):

- A* *Підшкірно
- B* Внутрішньовенно краплинно
- C* Перорально
- D* Внутрішньом’язово
- E* Внутрішньошкірно

92

До провізора звернувся пацієнт з питанням про найбільш оптимальний час прийому антациду. Проконсультуйте, які умови застосування є вірними?

- A* *За потреби
- B* Перед прийомом їжі
- C* Одразу ж після прийому їжі
- D* Під час прийому їжі
- E* Незалежно від прийому їжі

93

До аптеки звернувся пацієнт із скаргами на печію. Після співбесіди провізор запропонував декілька антацидних препаратів. Пацієнт поцікавився їх небажаними ефектами. Зазначте, для якого з антацидів характерний феномен “рикошету”?

- A* *Натрію гідрокарбонат
- B* Алюмінію гідроксид + магнію гідроксид
- C* Алюмінію фосфат
- D* Кальцію карбонат + магнію карбонат
- E* Алюмінію гідроксид + магнію гідроксид + анестезин

94

До провізора звернувся пацієнт із скаргами на печію. Після співбесіди провізор запропонував антацидний препарат та зауважив, що його слід вживати окремо від інших ліків. Вкажіть, який інтервал часу необхідно витримати між

застосуванням препаратів:

A *1,5-2 год.

B 0,5 год.

C 6 год.

D 1 год.

E 12 год.

95

До провізора звернувся відвідувач аптеки з проханням порекомендувати засіб для лікування герпесу губ. Визначте, який з перерахованих симптомів при герпесі є “загрозливим”?

A *Нагноєння висипань

B Поєднання герпесу з нежитем

C Герпес у хворого похилого віку

D Герпес у жінок під час місячних

E Герпес, що супроводжується субфебрильною температурою

96

Хворий, 35 років, звернувся до провізора зі скаргами на загальну слабкість та діарею. Який “загрозливий” симптом дозволяє запідозрити у хворого серйозне захворювання, що вимагає обов'язкового втручання лікаря, при гострій діарейі:

A *Діарея, що супроводжується втратою свідомості

B Здуття живота

C Рідкий кал

D Діарея, що супроводжується печією

E Відсутність апетиту

97

До провізора звернулася жінка з питанням щодо протипоказань до застосування комбінованих пероральних контрацептивів. Зазначте яким категоріям жінок не варто їх використовувати?

A *Усе вказане

B Жінкам з раком молочної залози

C Жінкам, що годують грудьми

D Жінкам, що мають мігрень і вогнищеві неврологічні симптоми

E Жінкам, що приймають протисудомні і/або протитуберкульозні препарати

98

Проконсультуйте відвідувачку аптеки, коли слід починати прийом комбінованих пероральних контрацептивних препаратів після переривання вагітності?

A *Відразу ж або протягом 7 днів

B Протягом 12 днів

C Протягом 9 днів

D Протягом 14 днів

E Будь-коли

99

Проконсультуйте лікаря, який із лікарських засобів утворює хелатні комплекси зі

сполуками кальцію і магнію, що призводить до зменшення процесу їх всмоктування?

A *тетрациклін

B папаверин

C парацетамол

D кислота аскорбінова

E атенолол

100

Проконсультуйте лікаря, у якій концентрації застосовують розчини глюкози в якості розчинника (носія) ЛЗ при парентеральному введенні:

A *5%

B 0,25%

C 1%

D 30%

E 0,9%

101

Проконсультуйте лікаря, у якій комбінації ліків покращується засвоєння заліза в організмі?

A *Засоби заліза + кислота аскорбінова

B Засоби заліза + кислота нікотина

C Засоби заліза + мінерали

D Засоби заліза + вітаміни

E Засоби заліза + кислота аденозинтрифосфорна

102

До аптеки звернувся пацієнт із скаргами на сухий кашель, який турбує його останні 3 тижні. Що Ви, як клінічний провізор, можете йому порадити?

A *Запитати, чи не застосовує він інгібітори АПФ та порадити звернутися до лікаря

B Порадити настій трави термопсису

C Порадити амброксол

D Порадити пакселадин

E Порадити протикашльовий лікарський засіб

103

Проконсультуйте лікаря та хворого, який муколітичний лікарський засіб не можна запивати розчинами, що мають лужну реакцію, через несумісність?

A *Амброксол

B Преноксдіазин

C Ацетилцистеїн

D Калію йодид

E Екстракт алтеї лікарської

104

Проконсультуйте лікаря, який лікарський засіб може призвести до кристалурії оксалатів:

A *Аскорбінова кислота (вітамін С).

B Ретинол (вітамін А).

C Піридоксин (вітамін В₆).

D Тіамін (вітамін В₁).

E Рибофлавін (вітамін В₂).

105

Проконсультуйте лікаря, який гіпотензивний лікарський засіб може спричинити появу брадикардії, бронхоспазму, розладів сну, нічних кошмарів, загострення псоріазу у пацієнтів?

A. *Бісопролол

B. Лізиноприл

C. Фуросемід

D. Гідрохлортіазид

E. Амлодипін

106

У пацієнта К., 35 років, 5 років тому після застосування глібенкламіду виник набряк Квінке. Проконсультуйте лікаря, до якого лікарського засобу може виникнути перехресна алергія при відомій підвищеній чутливості пацієнта до похідних сульфонілсечовини?

A *Фуросемід

B Бісопролол.

C Метотрексат

D Мефенамінова кислота

E Ацетилсаліцилова кислота

107

В межах фармацевтичної опіки пацієнта вкажіть умови раціонального застосування розчину для пероральної регідратації:

A *До розчину недопустиме додавання цукру

B Лікарський засіб слід приймати під час або одразу після їжі

C Після застосування лікарського засобу ротову порожнину слід прополоскати водою

D При застосуванні лікарського засобу сеча може забарвлюватися у червоний колір

E При застосуванні лікарського засобу кал може забарвлюватися у чорний колір

108

Проінформуйте лікаря про ступінь біодоступності лікарського препарату при внутрішньовенному введенні:

A *100%

B 50%

C 25%

D 75%

E 10%

109

У межах фармацевтичної опіки, скерованої на хворого, вкажіть, у якому з перерахованих випадків, що супроводжуються лихоманкою, припустиме відповідальне самолікування:

- A.** *Підвищення температури тіла до 38,5°C не більше 2 днів
- B.** Підвищення температури тіла вище 38,5°C протягом 3 днів і більше
- C.** Підвищення температури тіла вище 37,5°C протягом 2 тижнів
- D.** Підвищення температури тіла вище 39,0°C
- E.** Підвищення температури тіла супроводжується розладами свідомості, судомами

110

До аптеки звернувся хворий, якого турбують підвищення температури до 38,6°C і нежить. Хворий попередив, що у нього алергічна реакція на ацетилсаліцилову кислоту. Укажіть, який препарат доцільно порадити хворому:

- A** *Парацетамол
- B** Аскофен
- C** Аспірин
- D** Цитрамон
- E** Ібупрофен

111

Порекомендуйте протикашльовий засіб, застосування якого припустиме водіям та особам інших професій, що вимагають підвищеної уваги:

- A.** *Преноксдіазин
- B.** Кодеїн
- C.** Бутамірат
- D.** Декстрометорфан
- E.** Окселадин

112

Проконсультуйте хворого щодо раціонального застосування лопераміду при гострій неінфекційній діарейі:

- A** *Спочатку 4 мг, потім по 2 мг після кожного випорожнення кишечника у першу добу
- B** По 2 мг 2-3 рази на добу у першу добу
- C** По 2 мг 4-6 раз на добу протягом 3-х діб
- D** По 2 мг 4-6 раз на добу протягом 7-и діб
- E** Лише однократний прийом 4 мг на добу

113

Проконсультуйте лікаря, який препарат раціонально застосовувати для усунення закрепи хворому на печінкову недостатність (за наявності гіперамоніємії):

- A** *Лактулозу
- B** Рицинову олію
- C** Вазелінову олію
- D** Плоди жостера
- E** Листя сени

114

Назвіть препарат, який протипоказаний для лікування печії у хворих на серцеву недостатність:

- A* *Гідрокарбонат натрію
- B* Алюмінію фосфат
- C* Фамотидин
- D* Омепразол
- E* Кальцію карбонат

115

Укажіть найчастіший побічний ефект, який виникає при прийомі антацидних препаратів, що містять сполуки алюмінію:

- A* *Закреп
- B* Діарея
- C* Печія
- D* Утруднення сечовиділення
- E* Метеоризм

116

Проконсультуйте лікаря, який НПЗП доцільно призначити хворому на ревматоїдний артрит і супутню виразку шлунка:

- A* *Целекоксиб
- B* Ацетилсаліцилову кислоту
- C* Індометацин
- D* Диклофенак натрію
- E* Піроксикам

117

Із наведених нижче оберіть комбінацію препаратів, застосування яких показане для профілактики остеопорозу:

- A* *Кальцію і вітаміну D
- B* Кальцію і вітаміну А
- C* Кальцію і вітаміну Е
- D* Кальцію і вітаміну С
- E* Кальцію і вітаміну К

118

Укажіть, з розвитком якого стану пов'язане виникнення м'язової слабкості, судом у литкових м'язах, порушення сну і серцевого ритму на тлі тривалого прийому препаратів кальцію:

- A* *Гіпомагніємії
- B* Гіпермагніємії
- C* Гіперкальціємії
- D* Гіпокаліємії
- E* Гіперкаліємії

119

Оберіть вірну рекомендацію щодо вибору препаратів для симптоматичного

лікування суглобового та м'язового болю:

A *Застосовувати НПЗП у м'яких лікарських формах

B Застосовувати НПЗП для перорального прийому

C Поєднувати застосування пероральних та місцевих форм НПЗП

D Застосовувати комбінацію ненаркотичних та наркотичних анальгетиків

E Застосовувати препарати глюкокортикостероїдів

120

Із наведених нижче укажіть активну речовину у складі лікарських препаратів місцевої дії, призначених для купірування м'язового болю у дітей:

A *Ментол

B Бджолина отрута

C Зміїна отрута

D Екстракт перцю стручкового

E Метилсаліцилат

121

Із наведених нижче оберіть заходи профілактики НПЗП-гастропатій:

A *Застосування гастроцитопротекторів на тлі НПЗП

B Застосування НПЗП у ректальних лікарських формах

C Застосування НПЗП у парентеральних лікарських формах

D Застосування НПЗП з групи неселективних інгібіторів ЦОГ

E Застосування НПЗП для профілактики больового нападу

122

Проконсультуйте лікаря, з препаратами якої групи не рекомендується поєднувати місцеве застосування препаратів саліцилової кислоти при лікуванні вугрової хвороби:

A *НПЗП

B Ретиноїдами

C Антибіотиками

D Кератолітичними засобами

E Ентеросорбентами

123

Оберіть вірну рекомендацію щодо раціонального застосування безрецептурних препаратів бромю під час симптоматичного лікування ситуативної тривоги:

A *Дотримуватись дієти, збагаченої калієм

B Дотримуватись дієти, збагаченої хлоридом натрію

C Приймати препарати перед їдою

D Не застосовувати особам із серцево-судинними захворюваннями

E Не припиняти прийом при появі симптомів “уявної застуди”

124

Укажіть, який із нижченаведених симптомів при герпесі губ вважається «загрозливим»:

A *Висип на обширних ділянках слизової і шкіри

B Гіперемія в області появи висипу

- C* Поява групи дрібних везикул на слизовій рота
- D* Утворення м'якого струпу (ерозії) на місці висипу
- E* Утворення твердого струпу на місці висипу

125

Поясніть пацієнту, 48 років, зі скаргами на закреп, коли очікувати дію проносних засобів, що містять антраглікозиди:

- A* *Через 8-10 годин
- B* Через 2 години
- C* Через 30 хвилин
- D* Через 4 години
- E* Через 24 години

126

Укажіть заходи, які необхідно порекомендувати при хімічному опіці сірчаною кислотою:

- A* *Примочки з 3% розчином натрію гідрокарбонату
- B* Примочки з 20% розчином глюкози
- C* Примочки з 1% розчином оцтової кислоти
- D* Обробка олією
- E* Промивання сольовим розчином

127

Укажіть найбільш оптимальні умови прийому препаратів кальцію при профілактиці та лікуванні остеопорозу:

- A* * На ніч
- B* У будь-який час доби
- C* До прийому їжі
- D* Натщесерце
- E* У ранні ранкові години

128

Хворому на виразку шлунка із підвищеною секреторною та кислотоутворюючою функціями призначений омепразол у таблетках по 40 мг. Надайте рекомендації щодо умов раціонального застосування даного препарату:

- A* * Приймати за 30 хвилин до прийому їжі
- B* Вживати через 1 годину після прийому їжі
- C* Приймати під час вживання їжі
- D* Таблетки розжовувати
- E* Запивати молоком

129

Хвора, 11 років, надійшла в інфекційне відділення з підозрою на грип. У неї температура тіла – 38,7 °С, біль у м'язах, запаморочення. Який засіб слід рекомендувати як жарознижуючий в даній ситуації?

- A* *Парацетамол
- B* Диклофенак натрію
- C* Німесулід

D Ацетилсаліцилова кислота

E Целекоксиб

130

До аптеки звернувся відвідувач із скаргами на біль голови. В анамнезі гіпертонічна хвороба з максимальними цифрами 180/100 мм.рт.ст., періодично турбує запаморочення. Які дії?

A *Скерувати хворого на консультацію до лікаря

B Відпустити комбінацію анальгетика і кофеїну

C Відпустити засіб, що покращує мозковий кровообіг

D Відпустити антигіпертензивний засіб

E Відпустити ненаркотичний анальгетик

131

До аптеки звернувся чоловік зі скаргою на печію. Наявність якого додаткового симптому має спонукати фармацевта спрямувати хворого на консультацію до лікаря?

A *Блювання «кавовою гущею»

B Помірний метеоризм

C Відрижка кислим

D Відрижка повітрям

E Відрижка гірким

132

Хвору 35 років турбує чхання, закладеність і виділення з носа. Хворіє другу добу, стан пов'язує з переохолодженням. ОТС-препарати якої групи можна рекомендувати хворій?

A *Деконгестанти

B Н₁-гістаміноблокатори перорально

C Н₁-гістаміноблокатори місцево

D Препарати кромогліцієвої кислоти місцево

E Глюкокортикоїди місцево

133

Укажіть припустимий термін застосування ненаркотичних анальгетиків для симптоматичного лікування головного болю напруги без консультації лікаря:

A *Не більше 2 діб

B Не застосовувати без консультації лікаря

C Не більше 1 місяця

D Не більше 2 тижнів

E Не більше 1 тижня

134

Здійсніть фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря, щодо вибору НПЗП для усунення больового синдрому у хворій похилого віку з діагнозом коксартрозу. Проінформуйте, який з наведених НПЗП чинить найвиразнішу хондродеструктивну дію:

A * Індометацин

- B*** Мелоксикам
- C*** Целекоксиб
- D*** Диклофенак натрію
- E*** Кетопрофен

135

До аптеки звернулась дівчина зі скаргами на нежить, який виник після появи у домі кошеняти та триває протягом 10-ти діб. До лікаря не зверталась. Які рекомендації слід дати?

- A*** *Необхідна консультація лікаря
- B*** Фенілефрин у краплях
- C*** Левоцетиризин у таблетках
- D*** Розчин морської солі у краплях
- E*** Оксиметазолін у спреї

136

Укажіть, застосування яких препаратів найчастіше провокує виникнення вугрової висипки?

- A*** *Глюкокортикостероїдів
- B*** НПЗП
- C*** Ентеросорбентів
- D*** Діуретиків
- E*** Антигістамінних препаратів

137

Надайте фармацевтичну опіку, скеровану на пацієнта, щодо оптимального режиму застосування засобів кальцію для профілактики остеопорозу:

- A*** * Приймати ввечері
- B*** Приймати в обідню пору
- C*** Приймати вранці та в обідню пору
- D*** Приймати вранці
- E*** Приймати у будь-який період доби

138

Лікарські засоби звіробою є потужними індукторами ферментів. Надайте фармацевтичну опіку та поінформуйте пацієнта, до яких наслідків може призвести одночасне застосування засобів звіробою та інших ліків:

- A*** * Зниження ефективності інших лікарських засобів
- B*** Посилення токсичності засобів звіробою
- C*** Посилення токсичності інших лікарських засобів
- D*** Підвищення безпеки інших лікарських засобів
- E*** Підвищення ефективності інших лікарських засобів

139

Порекомендуйте пацієнту групу препаратів, яка показана для профілактики та лікування дисбіотичних розладів на тлі антибіотикотерапії:

- A*** * Пробіотики
- B*** Уросептики

C Холеретики
D Антациди
E Прокінетики

140

Проконсультуйте провізора-інтерна, який и наведених нижче активних інгредієнтів відхаркувальних рослинних препаратів може спричинити блювання при перевищенні дози?

A * Трава термопсису
B Коріння солодки
C Корінь алтеї
D Листя плюща
E Трава чабрецю

141

Хворий 75-ти років страждає на хронічний закреп. Вкажіть синтетичний проносний лікарський засіб, який слід порекомендувати пацієнту:

A * Бісакодил
B Магнію сульфат
C Сенаде
D Олія рицини
E Екстракт крушини

142

Дайте пораду дівчині-підлітку, яка звернулась до аптеки з проханням порекомендувати засіб проти вугрового висипу. Візуально: шкіра обличчя жирна з дрібними гнійнічками та комедонами на чолі, носі та підборідді:

A * Застосовувати місцево кератолітичні засоби
B Застосовувати топічні антибіотики
C Застосовувати протирання 90% розчином етилового спирту
D Застосовувати топічні глюкокортикостероїди
E Застосовувати кератиноїди системної дії

143

Надайте фармацевтичну опіку, скеровану на пацієнта, щодо максимальної тривалості застосування безрецептурних нестероїдних протизапальних засобів без консультації лікаря:

A * 3 дні
B 15 днів
C 30 днів
D 2 тижні
E 2 місяці

144

Хворий звернувся до провізора зі скаргою на неефективність місцевого лікування герпесу губ із застосуванням ацикловіру 2 рази на добу. Вкажіть найбільш оптимальну кратність застосування даної мазі:

A * кожні 4-5 годин

B одноразово
C раз на добу
D кожні 12 годин
E один раз на 3 дні

145

До провізора звернулася жінка 76-ти років, яка приймала рослинний послаблюючий засіб сеннадексин протягом місяця, але в останні дні його дія суттєво зменшилася. Зміна ефективності препарату пояснюється розвитком:

A *Толерантності
B Залежності
C Кумуляції
D Антагонізму
E Тахіфілаксії

146

Який шлях введення будесоніду є доцільним для лікування алергічного риніту?

A *Інтраназальний
B Пероральний
C Нашкірний
D Внутрішньовенний
E Внутрішньом'язовий

147

Відвідувач аптеки скаржиться на здуття живота, яке виникло після вживання жирної їжі. Яка комбінація ліків є оптимальною для симптоматичного лікування?

A *Панкреатин+Домперидон
B Панкреатин+Лоперамід
C Дротаверин+Панкреатин
D Панкреатин+Алюмінію гідроксид
E Панкреатин+Калію бромід

148

Порекомендуйте відвідувачу аптеки безрецептурний лікарський засіб місцевої дії для симптоматичного лікування поверхневих ран:

A *Мірамістин
B Бензилбензоат
C Оксиметазолін
D Саліцилова кислота
E Беклометазон

149

Які рекомендації необхідно дати хворому при посиленні висипань і сухості шкіри після тижневого використання противугрового препарату?

A *Продовжувати лікування, оскільки це період «уявного погіршення»
B Збільшити кратність використання препарату
C Зменшити кратність використання препарату
D негайно звернутися до лікаря

E негайно відмінити препарат

150

Якою є необхідна тривалість нанесення мазі ацикловіру для лікування герпесу губ?

- A** *5-10 днів
- B** 2-4 тижні
- C** до 2 днів
- D** 10-20 днів
- E** 4-6 місяців

151

В аптеку звернувся чоловік зі скаргою на печію, що турбує його другу добу. Наявність якого додаткового симптому має спонукати фармацевта спрямувати хворого на консультацію до лікаря?

- A** *Наявність сильного болю у животі
- B** Наявність помірного метеоризму
- C** Наявність відрижки кислим
- D** Наявність відрижки повітрям
- E** Наявність відрижки гірким

152

Проконсультуйте лікаря-інтерна, прийом якого препарату у дітей на тлі лихоманки вірусного походження може спричинити розвиток синдрому Рея (енцефалопатія, жирова дистрофія печінки):

- A.** *ацетилсаліцилової кислоти
- B.** целекоксибу
- C.** ібупрофену
- D.** метамізолу натрію
- E.** парацетамолу

153

Проконсультуйте лікаря-інтерна, які антибактеріальні препарати застосовуються як препарати вибору для лікування позашпитальної пневмонії у дорослої людини:

- A.** *цефалоспорини
- B.** сульфаніламід
- C.** аміноглікозиди
- D.** лінкозаміди
- E.** поліміксини

154

Проконсультуйте лікаря, які з нижченаведених препаратів недоцільно застосовувати у комплексній терапії бронхіальної астми:

- A.** *протикашльові
- B.** інгаляційні глюкокортикоїди
- C.** муколітичні
- D.** β_2 -адреноміметики
- E.** антагоністи лейкотрієнових рецепторів

155

Проінформуйте лікаря, які побічні ефекти можуть виникнути на тлі прийому флутиказону пропіонату в комплексній терапії бронхіальної астми:

- A.** *всі перераховані
- B.** посилення апетиту
- C.** кандидоз порожнини рота
- D.** підвищення маси тіла
- E.** гастродуоденальні виразки

156

Проконсультуйте лікаря-інтерна, який антиагрегант доцільно призначити пацієнту з ІХС та супутнім гастродуоденітом:

- A.** *клопідогрель
- B.** ацетилсаліцилова кислота
- C.** гепарин
- D.** варфарин
- E.** неодикумарин

157

Проконсультуйте лікаря-інтерна, який лікарський засіб з групи інгібіторів АПФ є препаратом вибору для пацієнта з артеріальною гіпертензією та супутньою патологією печінки:

- A.** лізиноприл
- B.** еналаприл
- C.** периндоприл
- D.** раміприл
- E.** фозиноприл

158

Проконсультуйте лікаря-інтерна, який з нижченаведених препаратів доцільно призначити хворому з діагнозом: ІХС, стенокардія напруження III ФК, у якого виникла толерантність на тлі тривалого застосування нітратів:

- A.** молсидомін
- B.** гепарин
- C.** ацетилсаліцилова кислота
- D.** метопролол
- E.** гідрохлортіазид

159

Проінформуйте лікаря-інтерна, яка група антибактеріальних лікарських засобів може змінювати вираженість гіпоглікемічної дії препаратів сульфонілсечовини при сумісному застосуванні:

- A.** *сульфаніламід
- B.** пеніциліни
- C.** макроліди
- D.** цефалоспорини
- E.** карбопенеми

160

Проконсультуйте лікаря-інтерна, через який час розвинеться терапевтичний ефект кромоглікату натрію, призначеного хворому з алерген-індукованою бронхообструкцією:

- A.** - через 2 тижні та більше
- B.** через 30-40 хвилин
- C.** через 24 години
- D.** через 48 годин
- E.** через 3-4 дні

161

До аптеки звернувся чоловік, 35 років, зі скаргами на закладеність носа, утруднене носове дихання. Який симптом необхідно уточнити провізору і, за його наявності, скерувати пацієнта до лікаря?

- A** *Гнійні виділення з носа
- B** Виділення водянистої рідини з носа
- C** Погіршення нюху
- D** Біль голови
- E** Підвищення температури тіла до 38°C

162

Проконсультуйте лікаря-інтерна, який лікарський препарат доцільно призначити для замісної терапії хворому з недостатністю зовнішньосекреторної функції підшлункової залози:

- A.** *панкреатин
- B.** ранітидин
- C.** дротаверин
- D.** пірензепін
- E.** магнію сульфат

163

Проінформуйте лікаря-гастроентеролога, з якою метою включено симетикон до складу комбінованих антацидних засобів:

- A.** *зменшення явищ метеоризму
- B.** зменшення кислотності шлункового вмісту
- C.** підвищення кислотності шлункового вмісту
- D.** пролонгування ефекту антацидного компонента
- E.** поліпшення смакових якостей препарату

164

Проконсультуйте пацієнта, який з препаратів, призначених лікарем для комплексного лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, викликав у нього металевий присмак:

- A.** метронідазол
- B.** кларитроміцин
- C.** амоксицилін
- D.** омепразол

E. алюмінію фосфат

165

Проконсультуйте лікаря-інтерна, який препарат доцільно призначити хворому з хронічним атрофічним гастритом для покращення моторики ШКТ:

- A.** метоклопрамід
- B.** омепразол
- C.** панкреатин
- D.** симетикон
- E.** алюмінію фосфат

166

Укажіть рекомендований період прийому препаратів заліза після нормалізації вмісту гемоглобіну та еритроцитів у крові пацієнта із залізодефіцитною анемією (для заповнення ендogenous „депо”):

- A.** *2-3 місяці
- B.** 1-2 дні
- C.** 1-2 тижні
- D.** 1 рік
- E.** усе подальше життя

167

Вкажіть добову дозу елементарного заліза, яку рекомендує ВООЗ вагітним жінкам для профілактики залізодефіцитної анемії:

- A.** -*60 мг/добу
- B.** 10 мг/добу
- C.** 100 мг/добу
- D.** 300 мг/добу
- E.** 600 мг/добу

168

Дитині 6 років була призначена комплексна терапія залізодефіцитної анемії. Через деякий час батьки помітили почорніння зубів у дитини. Вкажіть лікарський засіб, який міг спричинити це явище:

- A.** - заліза сульфат
- B.** аскорбінова кислота
- C.** фолієва кислота
- D.** кальцію пантотенат
- E.** піридоксину гідрохлорид

169

До аптеки звернувся відвідувач за знеболювальним засобом з приводу болю у попереку. Скаржитися також на незначну лихоманку, слабкість, часті і болючі сечовиділення. Яку рекомендацію ви повинні дати хворому ?

- A.** *терміново звернутися до лікаря
- B.** приймати анальгетик-антипіретик
- C.** застосовувати НПВП місцевої дії
- D.** застосовувати місцевопоздразнювальні засоби

E. застосовувати вітаміни групи В

170

Проконсультуйте лікаря-інтерна, який лікарський засіб показаний для уролітичної терапії хворому з сечокам'яною хворобою за наявності лабораторного підтвердження сечокислих конкрементів:

- A.** *блемарен
- B.** верапаміл
- C.** дігосин
- D.** гідрохлортіазид
- E.** пантопразол

171

Проінформуйте лікаря-інтерна, для якої групи лікарських препаратів, які використовуються в комплексній терапії бронхіальної астми, характерна побічна дія у вигляді кандидозу слизової оболонки ротоглотки:

- A.** - інгаляційні глюкокортикостероїди
- B.** β -адреноміметики неселективні
- C.** М-холіноблокатори
- D.** антагоністи лейкотрієнових рецепторів
- E.** метилксантини

172

Вкажіть, який з препаратів протипоказаний хворому з кашлем за наявності великої кількості густого мокротиння:

- A.** *лібексин
- B.** амброксол
- C.** ацетилцистеїн
- D.** карбоцистеїн
- E.** калію йодид

173

Проінформуйте пацієнта щодо оптимальної тривалості терапії снодійними та седативними засобами безрецептурного відпуску:

- A.** *10-14 днів
- B.** однократний прийом
- C.** 3-4 дні
- D.** 2 місяці
- E.** 6 місяців

174

Для застереження пацієнта, який тривалий час приймає антацидні препарати, укажіть їх найбільш імовірний побічний ефект:

- A.** *дисбактеріоз
- B.** головний біль
- C.** сухий кашель
- D.** інсомнія
- E.** біль при сечовиділенні

175

Проконсультуйте лікаря-інтерна, яка група препаратів для терапії цукрового діабету II типу є найбільш безпечною в період вагітності:

- A.** *інсуліни
- B.** похідні сульфонілсечовини
- C.** бігуаніди
- D.** тiazолідиндіони
- E.** метглітиніди

176

Проконсультуйте хворого на хронічний пієлонефрит, який з нижченаведених фітопрепаратів доцільно застосовувати для профілактики загострення захворювання:

- A.** *канефрон Н
- B.** валеріана
- C.** пасифлора
- D.** синупрет
- E.** алтея лікарська

177

Вкажіть імуносупресивний препарат для лікування нефротичного синдрому у хворого з резистентністю до глюкокортикостероїдної терапії в анамнезі:

- A.** *циклофосфамід
- B.** левамизол
- C.** ауранофін
- D.** індометацин
- E.** лізиноприл

178

Порекомендуйте потужний діуретик із найбільш тривалим ефектом для пацієнта з хронічною нирковою недостатністю та артеріальною гіпертензією:

- A.** *торасемід
- B.** фуросемід
- C.** маніт
- D.** етакринова кислота
- E.** спіронолактон

179

При відпуску з аптеки препаратів бензоїлпероксиду для тривалого лікування вугрової хвороби проінформуйте хворого, які шкірні прояви свідчать про їх дію:

- A.** *відлущування шкіри
- B.** зблідніння шкіри
- C.** свербіж шкіри
- D.** пігментація шкіри
- E.** підвищення сальності шкіри

180

У хворого після фізичного навантаження з'явились біль і припухлість правого

колінного суглобу. Оберіть найбільш безпечний препарат для початкової терапії.

- A.** *Диклофенак гель
- B.** Ацетилсаліцилова кислота перорально
- C.** Анальгін внутрішньом'язово
- D.** Німесулід перорально
- E.** Мазь преднізолону

181

Хворий з приводу гострого риніту застосовував краплі нафтизину. Через 7 днів лікування ефект зменшився и зник, при збільшенні дози нафтизину ефект не відновився. Як називається це явище?

- A.** *тахіфілаксія
- B.** антагонізм
- C.** синдром відміни
- D.** синергізм
- E.** феномен рикошету

182

Пацієнту 51-го року з цирозом печінки призначений прийом гепатопротекторного препарату, що містить есенціальні фосфоліпиди. Вкажіть оптимальну тривалість курсового лікування гепатопротектором:

- A.** *не менше трьох місяців
- B.** три-чотири дні
- C.** один тиждень
- D.** два тижні
- E.** не більше трьох тижнів

183

Порекомендуйте відвідувачу аптеки безрецептурний лікарський засіб, що забезпечує пряму протипедикульозну дію:

- A.** *перметрин
- B.** лоратадин
- C.** декспантенол
- D.** диметикон
- E.** хлоропірамін

184

З приводу непродуктивного кашлю лікар призначив лікарський засіб, що знижує збудливість периферичних сенсорних рецепторів та не викликає пригнічення дихання. Який лікарський засіб призначено пацієнту?

- A.** *преноксдіазин
- B.** амоксицилін
- C.** кодеїн
- D.** мідекаміцин
- E.** ацетилцистеїн

185

У хворого біль у спині, хронічний гастрит в анамнезі. Який з препаратів має найменшу ушкоджувальну дію на слизову оболонку шлунка і може бути рекомендований для симптоматичної терапії?

- A.** * парацетамол
- B.** аспірин
- C.** індометацин
- D.** ібупрофен
- E.** ортофен

186

В аптеку звернулася жінка зі скаргами на діарею, що триває понад 3 доби з болісними позивами. Які будуть рекомендації провізора аптеки?

- A.** *необхідно звернутися до лікаря
- B.** Прийом лопераміду
- C.** Прийом панкреатину
- D.** Прийом активованого вугілля
- E.** Прийом фталілсульфатіазолу

187

Надайте фармацевтичну опіку матері щодо вибору вітрогінного засобу для її 3-х місячної дитини:

- A.** *діосмектит
- B.** біле вугілля
- C.** панкреатин
- D.** симетикон
- E.** активоване вугілля

188

Порекомендуйте відвідувачу аптеки найбільш безпечний препарат для зняття жару при застуді:

- A.** *парацетамол
- B.** ацетилсаліцилова кислота
- C.** індометацин
- D.** диклофенак натрію
- E.** аскорбінова кислота

189

Яка комбінація лікарських речовин є раціональною для епізодичного прийому при головному болю напруги у хворого на артеріальну гіпертензію?

- A.** *Парацетамол+ібупрофен
- B.** Парацетамол+ібупрофен+кофеїн
- C.** Парацетамол+пропіфеназон+кофеїн
- D.** Парацетамол+ кофеїн
- E.** Парацетамол+ацетилсаліцилова кислота+ кофеїн

190

Виникнення якого побічного ефекту можливе у хворого при прийомі хлоропіраміну, призначеного йому лікарем для лікування алергічного дерматиту?

- A.** *сонливість
- B.** безсоння
- C.** зниження апетиту
- D.** підвищення артеріального тиску
- E.** сухий кашель

191

В аптеці відсутні плоди глоду. Підберіть хворому аналогічну лікарську рослинну сировину, що виявляє гіпотензивну та седативну дію:

- A.** *собачої кропиви трава
- B.** Череди трава
- C.** Гірчака перцевого трава
- D.** Споришу трава
- E.** Софори японської плоди

192

Проконсультуйте лікаря-інтерна, чим обумовлена доцільність одночасного застосування хондропротекторів і НПЗП:

- A.** *Зменшенням дози НПЗП
- B.** Збільшенням дози НПЗП
- C.** Підвищенням біодоступності НПЗП
- D.** Зменшенням дози хондропротекторів
- E.** Збільшенням дози хондропротекторів

193

Надаючи фармацевтичну опіку пацієнту з стенокардією поясніть, який із призначених йому лікарських засобів слід застосовувати безпосередньо при появі задишки та болю за грудниною:

- A.** *нітрогліцерин
- B.** метопролол
- C.** триметазидин
- D.** ловастатин
- E.** еналаприл

194

У хворого, який звернувся в аптеку з приводу ГРВІ, спостерігається частий вологий кашель. Який із перерахованих препаратів доцільно додати до лікування пацієнту?

- A.** *ацетилцистеїн
- B.** кодтерпін
- C.** анальгін
- D.** парацетамол
- E.** лібексин

195

Надайте фармацевтичну опіку хворому на пневмонію щодо належного застосування призначених лікарем антибіотика амоксициліну та муколітика ацетил цистеїну:

- A. *Ацетилцистеїн необхідно приймати за 2 години до прийому антибіотика
- B. Ацетилцистеїн необхідно приймати під час їжі
- C. Ацетилцистеїн необхідно приймати одразу після прийому антибіотика
- D. Ацетилцистеїн необхідно запивати молоком
- E. Ацетилцистеїн необхідно приймати разом з антибіотиком

196

Пацієнтка з алергічним ринітом звернулась до аптеки з проханням порадити антигістамінний засіб, який не має впливу на серце та не впливає на керування автотранспортом. Виберіть антигістамінний засіб, який задовольняє вимоги пацієнтки:

- A. *кларитин
- B. клемастин
- C. дипразин
- D. мебгідролін
- E. фексофенадин

197

Який препарат для симптоматичного лікування сухого кашлю **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** пацієнту, що працює водієм?

- A. *декстрометорфан
- B. сироп подорожника
- C. корінь алтеї
- D. ацетилцистеїн
- E. амброксол

198

Надайте фармацевтину опіку, скеровану на лікаря: застосування яких антигіпертензивних лікарських засобів у пацієнта, що лікується з приводу цукрового діабету, може маскувати тахікардію, спричинену гіпоглікемією?

- A. *блокатори b-адренорецепторів
- B. Антагоністи кальцію
- C. Петлеві діуретики
- D. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту
- E. Блокатори рецепторів ангіотензину II

199

До провізора в аптеці звернулась мати 10-ти річної дитини з проханням відпустити знеболюючий препарат для дитини після екстракції зуба. Який препарат слід порадити?

- A. *ібупрофен
- B. Ацетилсаліцилова кислота
- C. Кеторолак
- D. Піроксикам
- E. Диклофенак натрію

200

Хворий скаржиться на біль в горлі. Серед наявних в аптеці таблетованих препаратів від болю в горлі підберіть хворому такий, що містить анетол:

- A.** *Ледин
- B.** Ефізол
- C.** Стрепсілс-оригінал
- D.** Інгаліпт
- E.** Ротокан

201

Поясніть відвідувачу аптеки, який з препаратів знижує абсорбцію фуросеміду при одночасному застосуванні:

- A.** *алюмінію гідроксид
- B.** папаверин
- C.** дротаверин
- D.** омепразол
- E.** платифілін

202

Хворий скаржиться на здуття живота після вживання жирної їжі. Вкажіть поліферментний препарат для лікування розладів травлення:

- A.** *Фестал
- B.** Фосфалюгель
- C.** Активоване вугілля
- D.** Альмагель
- E.** Ентеросгель

203

Під час прийому яких лікарських препаратів необхідно вживати достатню кількість лужного пиття, оскільки через погану розчинність діючих речовин можливий розвиток кристалоурії?

- A.** *сульфаніламід
- B.** Цефалоспорини
- C.** Панкреатин
- D.** Бісакодил
- E.** пеніциліни