

ПРИНЦИПИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕМОЛІЄНТІВ У ДІТЕЙ З АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ

Сівцева А.В., Давішня Н.В., Вєтрова К. В.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Artemsi92@gmail.com




Результати дослідження

Перелік асортименту емолієнтів в аптеці

Назва	Ціна (грн.)	Кількість дітей	Значення Загалом(%)
Белобазо крем	135,450	6	20
Афлорем емолієнт	170	9	30
Ліпікар Бальз.АР+М д/тіла	620	3	10
Молочко для шкіри CeraVe	360	6	20
Емоліум емульсія	330	3	10
Медідерм	300	3	10
Не використовують		9	30

Хто порадив емолієнти



■ Лікар ■ Самостійно ■ Фармацевт

Вступ


На сьогодні АТД поширений серед 10–20 % популяції та рівень захворюваності продовжує зростати внаслідок впливу на організм хімічних та інших чинників навколишнього середовища. Дебют АТД протягом перших 6 місяців життя спостерігається у 45 % випадків, протягом першого року життя – у 60 %, і до 5 літнього віку – у 85 % дітей. Суха шкіра є одним із характерних симптомів АТД. Більшість батьків не знають про необхідність постійного використання емолієнтів та різницю між ними і звичайним дитячими кремами.

Мета дослідження:

пошук та розробка принципів фармацевтичної опіки при застосуванні емолієнтів у дітей з atopічним дерматитом.

Матеріали та методи

Для досягнення поставленої мети було проведено анкетування серед 30 батьків дітей з АТД, що звернулися до аптеки з метою придбати емолієнти. Статистичну обробку даних отриманих в результаті дослідження проводили методами варіаційної статистики з використанням комп'ютерних програм.



Висновки

За отриманими даними було складено принципи фармацевтичної опіки при застосуванні емолієнтів у дітей з atopічним дерматитом та розроблено алгоритм бесіди фармацевта з відвідувачем аптеки при відпуску емолієнтів.