

# АСИМЕТРІЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ СЛІЗНОЇ ПЛІВКИ У ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ СУХОГО ОКА

Томашевська Ю.О., Кривов'яз С.О., Кривов'яз О.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

[tomasevskau@gmail.com](mailto:tomasevskau@gmail.com)

## Вступ

Синдром сухого ока:

- актуальна проблема сучасної охорони здоров'я, зокрема клінічної фармакології;
- характеризується порушеннями слізної плівки;
- розповсюджений у 75 % пацієнтів офтальмологічного профілю.

Діагностика - за допомогою аналізаторів слізної плівки - можливість встановити особливості патогенезу хвороби сухого ока – підвищене випаровування слізної рідини, недостатність водного компоненту або ж сукупність цих станів.

## Мета дослідження

Встановити відповідність значень кількісних показників стану слізної плівки в залежності від статі та визначити наявність різниці в показниках між правим та лівим оком.

## Матеріали та методи

Опрацьовано результати обстеження лівого та правого очей 783 пацієнтів обох статей віком від 18 до 82 років. Здійснено порівняльний аналіз показників часу розриву слізної плівки (NIBUT), стану ліпідного шару, втрати мейбомієвих залоз, висоти слізного меніска з та без урахування поділу на статі та ліве/праве око. Статистичну обробку проводили за допомогою пакету програм Microsoft Excel.

## Результати та їх обговорення

Показник стану слізної плівки		Чол. (у %)	Жін. (у %)
Норма всіх показників одного ока	ліве око	0	2,98
	праве око	0,41	2,23
Втрата мейбомієвих залоз	ліве око	69,51	68,34
	праве око	69,11	65,74
NIBUT	ліве око	13,82	24,02
	праве око	36,18	33,71
Висота слізного меніску	ліве око	43,09	48,60
	праве око	47,97	53,45

## Висновки

Виявлено статистично достовірну різницю в показнику NIBUT між правим та лівим оком для пацієнтів як чоловічої, так і жіночої статі.